叶兴阳

双语音标有声读物

双语音标
阅读创始人

注音阅
读英语
教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者： *叶兴阳*

内容来源： *公共领域英文原著*

适用对象： *英语学习者、教师、研究者*

版本日期： *2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 内布拉斯加州部分哺乳动物的分布(distribution Of Some Nebraskan Mammals) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

内布拉斯加州部分哺乳动物的分布(Distribution of Some Nebraskan Mammals)

第1/1页

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

['vɒljuːm] ['sɛvən] , [nəʊ] . [sɪks] , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 7 , No . 6 , pp . 479 - 487
体积 7 , 不 . 6 , pp . - - -

第7卷，第6期，第479-487页

['eɪprəl] - , -
April 21 , 1954
四月 - , -

1954年4月21日

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɒv; əv][sʌm; səm] [nɪ'bræskən] ['mæm(ə)lz]
Distribution of Some Nebraskan Mammals
分配 的 一些 内布拉斯加州 哺乳动物

内布拉斯加州部分哺乳动物的分布

[baɪ]
BY
经过

经过

[dʒeɪ] . [nɒks] [dʒəunz] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] .
J . KNOX JONES , JR .
J . 诺克斯 琼斯 , JR .

J. KNOX JONES, JR.

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

Lawrence1954
Lawrence1954
Lawrence1954

劳伦斯1954

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] , [mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

['editəz] : [iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] , ['tʃeəmən] , [ə; eɪ] . ['baɪrən] ['lenəd] , ['rɒbət] ['dʌbljuː] . ['wɪlsn]
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , A . Byron Leonard , Robert W . Wilson
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 一个 . 拜伦 伦纳德 , 罗伯特 W . 威尔逊

编辑：E·雷蒙德·霍尔（主席）、A·拜伦·伦纳德、罗伯特·W·威尔逊

['vɒljuːm] ['sɛvən] , [nəʊ] . [sɪks] , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 7 , No . 6 , pp . 479 - 487
体积 7 , 不 . 6 , pp . - - -
第7卷，第6期，第479-487页

['pʌblɪʃt] ['eɪprəl] - , -
Published April 21 , 1954
已发布 四月 - , -
发表于1954年4月21日

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州
堪萨斯大学

['lɒrəns] , ['kænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州
堪萨斯州劳伦斯

['prɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过
印刷者

[fɜːrd] [vɔɪlənd] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [steɪt] ['prɪntə(r)]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机
FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[tə'piːkə] , KANSAS195425 - -
TOPEKA , KANSAS195425 - 2530
托皮卡 , KANSAS195425 - -
堪萨斯州托皮卡 195425-2530

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɒv; əv][sʌm; səm] [nɪ'bræskən] ['mæm(ə)lz]
Distribution of Some Nebraskan Mammals
分配 的 一些 内布拉斯加州 哺乳动物
内布拉斯加州部分哺乳动物的分布

[baɪ]
by
经过
经过

[dʒeɪ] . [nɒks] [dʒəunz] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] .
J . Knox Jones , Jr .
J . 诺克斯 琼斯 , 小 .
J. Knox Jones, Jr.

[bɪ'kəz; bɪ'kɒz] ['mɪlətri] ['sɜːvɪs] [wɪl] [ˌɪntə'rʌpt] [maɪ] ['stʌdi] [ɒv; əv] [nɪ'bræskən] ['mæm(ə)lz] ,
Because military service will interrupt my study of Nebraskan mammals ,
因为 军队 服务 将要 打断 我的 学习 的 内布拉斯加州 哺乳动物 ,
因为服兵役会中断我对内布拉斯加州哺乳动物的研究，

[ai][ˌeɪ ˈem][hɪə(r)] [ˈpleɪsɪŋ] [ɒn][ˈrekɔːd; rɪˈkɔːd][ˈsɜːt(ə)n] [ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] [ɒn][ðə; ði] [ˌdʒiːəˈɡræfɪk] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn]
I am here placing on record certain information on the geographic distribution
我 是 这里 放置 在 记录 肯定 信息 在 这 地理 分配
[ɒv; əv] [ˈsevrəl] [ˈspiːʃiːz] — [ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] [ðæt] [ɪz] [θɔːt] [ˈpɜːtɪnənt] [tuː; tə] [ˈkʌrənt] [ˈstʌdiz] [ɒv; əv]
of several species — information that is thought pertinent to current studies of
的 一些 物种 — 信息 那 是 想法 相关 到 当前的 研究 的
[sʌm; səm][ɒv; əv][maɪ] [əˈsəʊʃɪeɪts] .
some of my associates .
一些 的 我的 同事 .

我在此记录一些关于几种物种地理分布的信息——这些信息被认为与我的一些同事目前的研究有关。

[məʊst][ɒv; əv] [ðɪs] [ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] [ɪz][prəˈvaɪdɪd][baɪ] [ˈspesəmən] [ˈriːs(ə)ntli] [kəˈlektɪd] [baɪ][ˌem ˈiː][ænd; ənd]
Most of this information is provided by specimens recently collected by me and
最多 的 这 信息 是 假如 经过 标本 最近 集 经过 我 和
[ˈʌðə(r)] [ˌreprɪˈzentətɪvz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˈkænzəs][mjuˈziːəm][ɒv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
other representatives of the University of Kansas Museum of Natural History
其他 代表 的 这 大学 的 堪萨斯州 博物馆 的 自然的 历史
,
,
,

这些信息大部分来自我和堪萨斯大学自然历史博物馆其他代表近期收集的标本。

[ɔːlˈðəʊ] [ˈspesəmən] [frɒm; frəm][ˈʌðə(r)] [kəˈlekʃn] [prəˈvaɪd] [sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈrekɔːdz] [ˌhɪərˈɪn]
although specimens from other collections provide some of the records herein
虽然 标本 从 其他 收藏 提供 一些 的 这 记录 在此处
[rɪˈpɔːtɪd] .
reported .
据报道 .

尽管本文所报告的部分记录来自其他收藏的标本。

[ðə; ði][ˈʌðə(r)] [kəˈlekʃn] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][ˌbaɪəˈlɒdʒɪk(ə)l] [sərˈve] [kəˈlekʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [steɪts]
The other collections are the Biological Surveys Collection of the United States
这 其他 收藏 是 这 生物 调查 收藏 的 这 团结的 各州
[ˈnæʃ(ə)nəl][mjuˈziːəm] ([ˈjuːˌɛsˈbiːz]) ,
National Museum (USBS) ,
国家的 博物馆 (USB接口) ,

其他藏品包括美国国家博物馆生物调查藏品（USBS），

[ðə; ði] [ˈheɪstɪŋz] [mjuˈziːəm] ([ˌeɪtʃ ˈem]) , [ðə; ði] [nəˈbræskə] [ɡeɪm] , [ˌfɒrɪˈsteɪʃən] [ænd; ənd] [pˈɑːks]
the Hastings Museum (HM) , the Nebraska Game , Forestation and Parks
这 黑斯廷斯 博物馆 (HM) , 这 内布拉斯加州 游戏 , 造林 和 公园
[kəˈmɪʃ(ə)n] (-) ,
Commission (NGFPC) ,
委员会 (-) ,

黑斯廷斯博物馆（HM）、内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会（NGFPC）

[ðə; ði][ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˌkæləˈfɔːniə][mjuˈziːəm][ɒv; əv] [ˈvɜːtɪbrət] [zuˈɒlədʒi] ([ɛmviːz]) ,
the University of California Museum of Vertebrate Zoology (MVZ) ,
这 大学 的 加利福尼亚州 博物馆 的 脊椎动物 动物学 (MVZ) ,

加州大学脊椎动物学博物馆（MVZ）

[ðə; ði][ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv] [ˈmɪʃɪɡən] [mjuˈziːəm][ɒv; əv][zuˈɒlədʒi] ([ɛmˈziː]) [ænd; ənd][ðə; ði][ˌjuːnɪˈvɜːsəti]
the University of Michigan Museum of Zoology (MZ) and the University
这 大学 的 密歇根州 博物馆 的 动物学 (MZ) 和 这 大学
[ɒv; əv] [nəˈbræskə] [steɪt] [mjuˈziːəm] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) .
of Nebraska State Museum (NSM) .
的 内布拉斯加州 状态 博物馆 (国家安全机制) .

密歇根大学动物学博物馆（MZ）和内布拉斯加州立博物馆（NSM）。

['greɪtf(ə)l] [ək'nɒlɪdʒmənt] [ˌhɪə'baɪ] [ɪz] [meɪd] [tuː; tə] [p'ɜːsənz] [ɪn] [tʃɑːdʒ] [ɒv; əv] [ðiːz] ['sevrəl]
Grateful acknowledgment hereby is made to persons in charge of these several
感激的 致谢 特此 是 制成 到 人 在 收费 的 这些 一些
[kə'lekʃn] [fɔː(r); fə(r)] ['lendɪŋ] [ðə; ði] [mə'tɪəriəlz] [kən'sɜːnd] .
collections for lending the materials concerned .
收藏 为了 贷款 这 材料 担心的 .

在此，谨向负责这些藏品的各位人士致以衷心的感谢，感谢他们借出相关资料。

['spesəmən] ['menʃ(ə)nd] [ɪn] [ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] [ə'kaʊnts] [ɑː(r); ə(r)] [ɪn] [ðə; ði] [ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɒv; əv] ['kænzəs]
Specimens mentioned in the following accounts are in the University of Kansas
标本 提及 在 这 下列的 账户 是 在 这 大学 的 堪萨斯州
[mju'ziːəm] [ɒv; əv] ['nætʃ(ə)rəl] ['hɪstri; 'hɪstəri] ,
Museum of Natural History ,
博物馆 的 自然的 历史 ,

以下描述中提到的标本均收藏于堪萨斯大学自然历史博物馆。

[ɪk'sept] [æz; əz] ['ʌðəwaɪz] ['steɪtɪd] .
except as otherwise stated .
除了 作为 否则 声明 .

除非另有规定。

[ɔːl] ['meʒəm(ə)nts] [ɑː(r); ə(r)] [ɪn] ['milimiːtəz] .
All measurements are in millimeters .
全部 测量 是 在 毫米 .

所有尺寸单位均为毫米。

['kʌlə(r)] [tɜːmz] [ɑː(r); ə(r)] [ðəʊz] [ɒv; əv] ['rɪdʒˌweɪ] (-) .
Color terms are those of Ridgway (1912) .
颜色 条款 是 那些 的 里奇韦 (-) .

颜色术语采用 Ridgway (1912) 的术语。

[ə; eɪ] [pɑːt] [ɒv; əv] [ðə; ði] [fʌndz] [fɔː(r); fə(r)] [fiːld] [wɜːk] [wɒz; wəz] [meɪd] [ə'veɪləb(ə)l] [baɪ] [ðə; ði] ['næʃ(ə)nəl]
A part of the funds for field work was made available by the National
一个 部分 的 这 资金 为了 场地 工作 曾是 制成 可用的 经过 这 国家的
['saɪəns] [faʊn'deɪʃ(ə)n] [ænd; ənd] [ðə; ði] ['kænzəs] [ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɪn'daʊmənt] [əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] .
Science Foundation and the Kansas University Endowment Association .
科学 基础 和 这 堪萨斯州 大学 捐赠基金 协会 .

部分实地考察资金由国家科学基金会和堪萨斯大学捐赠协会提供。

['sɔːrɛks] [sɪ'nɪriəs] - .
***Sorex cinereus haydeni* .**
索雷克斯 灰岩 - .

Sorex cinereus haydeni.

([bɛəd]) .
(Baird) .
(贝尔德) .

(贝尔德)

[sɪ'nɪərɪəs] [ʃruː] . — [tuː] [meɪl] [ʃruː] [wɜː(r); wə(r)] [træpt] [ɒn] ['eɪprəl] ['sɛvən] , - , [ə'mʌŋ]
Cinereous Shrew . — Two male shrews were trapped on April 7 , 1952 , among
灰烬 泼妇 . — 二 男性 鼩鼱 是 被困 在 四月 7 , - , 之中
[rɒks] [ə'lɒŋ] [æn; ən] [əʊld] ['reɪlrəʊd] [fɪl] ,
rocks along an old railroad fill ,
岩石 沿着 一个 老的 铁路 充满 ,

灰背鼩——1952年4月7日，两只雄性灰背鼩在一条废弃铁路填土的岩石间被捕获。

[fɔːr] [miː] . [en] ,
4 mi . N ,
4 米 . N ,

北面 4 英里，

[wʌn] / [ˌtuːˈtuː][miː] . [iː][ɒv; əv][ɒkˈteɪvɪə] , [ˈbʌtlə(r)] [ˈkaʊnti] ,
1 / 2 mi . E of Octavia , Butler County ,
1 / 2 米 . E 的 奥克塔维娅 , 巴特勒 县 ,

位于巴特勒县奥克塔维亚以东 1/2 英里处

[ðʌs] [ɪkˈstendɪŋ] [ðə; ði] [nəʊn] [ˌdʒiːəˈɡræfɪk] [reɪndʒ][ɒv; əv][es] . [siː] . - [əˈprɒksɪmətli] - [maɪlz]
thus extending the known geographic range of S . c . haydeni approximately 60 miles
因此 扩展 这 已知 地理 范围 的 S . c . - 大约 - 英里
[ˈsaʊθwəd] [frɒm; frəm][ə; eɪ][laɪn] [kəˈnektɪŋ] [pɜːtʃ] ,
southward from a line connecting Perch ,
向南 从 一个 线 连接 栖息 ,

因此，S. c. haydeni 的已知地理范围从连接 Perch 的线向南延伸了大约 60 英里。

[rɒk] [ˈkaʊnti] , [nəˈbræskə] , [wɪð] [wɔːl] [leɪk] , [sæk] [ˈkaʊnti] , [ˈaɪəwə] ([siː] [ˈdʒæksən] , - : - - -
Rock County , Nebraska , with Wall Lake , Sac County , Iowa (see Jackson , 1928 : 52 - 53
岩石 县 , 内布拉斯加州 , 和 墙 湖 , 萨克 县 , 爱荷华州 (看 杰克逊 , - : - - -
) ,
) ,
) ,

内布拉斯加州罗克县，以及爱荷华州萨克县沃尔湖（参见 Jackson，1928：52-53），

[ænd; ənd] [prəˈvaɪdɪŋ] [ðə; ði] [fɜːst] [ˈrekɔːd; rɪˈkɔːd] [ɒv; əv] [əˈkʌrəns] [ɪn][ðə; ði] [plæt] [ˈrɪvə(r)] [ˈvæli] .
and providing the first record of occurrence in the Platte River Valley .
和 提供 这 第一的 记录 的 发生 在 这 普拉特 河 谷 .

并首次记录了该物种在普拉特河谷的出现。

[tuː] [əˈdɪʃən(ə)l] [ˈspesəmən] , [ˈteɪkən][ɒn][dʒʊˈlaɪ] - , - , [ɑː(r); ə(r)][frɒm; frəm][ˌtuːˈtuː] - [wʌn] / [ˌtuːˈtuː]
Two additional specimens , taken on July 17 , 1952 , are from 2 - 1 / 2
二 额外的 标本 , 已采取 在 七月 - , - , 是 从 2 - 1 / 2
[miː] . [en][ɒv; əv][ɔːrd] ,
mi . N of Ord ,
米 . N 的 奥德 ,

另外两个标本于 1952 年 7 月 17 日采集，地点位于 Ord 以北 2.5 英里处。

[ˈvæli] [ˈkaʊnti] , [əˈlɒŋ] [ðə; ði] [laʊp] [ˈrɪvə(r)] , [ə; eɪ] [ˈtrɪbjətri] [ɒv; əv][ðə; ði] [plæt] [frɒm; frəm][ðə; ði]
Valley County , along the Loup River , a tributary of the Platte from the
谷 县 , 沿着 这 狼 河 , 一个 支流 的 这 普拉特 从 这
[nɔːθ] .
north .
北 .

山谷县，位于卢普河沿岸，卢普河是普拉特河从北部流出的支流。

[bləˈraɪnə] [ˌbrɛvɪˈkɔːdə] [ˌkærəlɪˈnɛnsɪs] ([ˈbɑːkmən]) .
Blarina brevicauda carolinensis (Bachman) .
布拉里纳 短尾 卡罗莱纳 (巴赫曼) .

Blarina brevicauda carolinensis (Bachman).

[ʃɔːt] - [teɪld] [ʃruː] . — [dʒeɪ] . [es] . [ˈfɪndˌli] [ænd; ənd][ai] , [ɪn][ə; eɪ] [ˌfɔːθˈkʌmɪŋ] [ˈpeɪpə(r)] ,
Short - tailed Shrew . — J . S . Findley and I , in a forthcoming paper ,
短的 - 有尾巴的 泼妇 . — J . S . 芬德利 和 我 , 在 一个 即将推出 纸 ,

短尾鼩鼱——JS Findley 和我，在即将发表的论文中，

[rɪˈvjuː] [ðə; ði] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ɒv; əv][bləˈraɪnə] [ˌbrɛvɪˈkɔːdə] [ɪn][ðə; ði] [ɡreɪt] [pleɪnz] [ˈriːdʒən] ,
review the distribution of Blarina brevicauda in the Great Plains region ,
审查 这 分配 的 布拉里纳 短尾 在 这 伟大的 平原 地区 ,

调查短尾黾在大平原地区的分布情况，

[rɪˈkɔːdɪŋ] [biː] . [biː] . [ˌkærəlɪˈnɛnsɪs][frɒm; frəm][ðə; ði] [ɪkˈstriːm] [ˌsaʊθˈiːstən] [ænd; ənd] [ˌsaʊθˈwestən]
recording B . b . carolinensis from the extreme southeastern and southwestern
记录 B . b . 卡罗莱纳 从 这 极端 东南部 和 西南

记录到来自极东南和西南地区的卡罗莱纳伯克霍尔德氏菌（B. b. carolinensis）。

[ˈkaunti] [ɒv; əv] [nəˈbræskə] .
counties of Nebraska .
县 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的各县。

[ə; eɪ][ˈsɪəriːz][ɒv; əv][faɪv] [ʃruː] [ɒv; əv] [ðɪs] [ˈspiːʃiːz] [ˈriːs(ə)ntli] [əbˈteɪnd] [frɒm; frəm] [θriː] [maɪlz] [saʊθ]
A series of five shrews of this species recently obtained from three miles south
一个 系列 的 五 鼩鼱 的 这 物种 最近 获得 从 三 英里 南
[ænd; ənd] [tuː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [nəˈbræskə] [ˈsɪti] [ɪn][ˈoʊtoʊiː] [ˈkaʊnti] ,
and two miles east of Nebraska City in Otoe County ,
和 二 英里 东方 的 内布拉斯加州 城市 在 奥托 县 ,

最近在内布拉斯加城以南三英里、以东两英里的奥托县发现了五只该物种的鼩鼱。

[ˈævərɪdʒ] [sɪɡˈnɪfɪkəntli] [smɔːlə(r)][ɪn][bəʊθ][ðə; ði][ˈkreɪniəl][ænd; ənd][ðə; ði][ɪkˈstɜːn(ə)l] [ˈmeʒəm(ə)nts]
average significantly smaller in both the cranial and the external measurements
平均的 显著地 较小的 在 两个都 这 颅骨 和 这 外部的 测量
[ðæn; ðən][ˈtɪpɪk(ə)l][biː] . [biː] . [ˌbrɛvɪˈkɔːdə] [ænd; ənd] [fɔːl] [wel] [wɪˈðɪn] [ðə; ði][reɪndʒ][ɒv; əv][ˌkærəlɪˈnɛnsɪs] .
than typical B . b . brevicauda and fall well within the range of carolinensis .
比 典型的 B . b . 短尾 和 落下 出色地 之内 这 范围 的 卡罗莱纳 .

平均而言，无论是颅骨还是外部测量值都明显小于典型的 B. b. brevicauda，并且完全在 carolinensis 的范围内。

[ˈævərɪdʒ] [ænd; ənd] [ɪkˈstriːm] [ɪkˈstɜːn(ə)l] [ˈmeʒəm(ə)nts] [ɒv; əv][ðə; ði][fɔː(r)][ˈædʌlts][frɒm; frəm][ˈoʊtoʊiː]
Average and extreme external measurements of the four adults from Otoe
平均的 和 极端 外部的 测量 的 这 四 成年人 从 奥托
[ˈkaʊnti] , [θriː] [meɪlz] [ænd; ənd][wʌn] [ˈfiːmeɪl] ,
County , three males and one female ,
县 , 三 男性 和 一 女性 ,

来自奥托县的四名成年人（三名男性和一名女性）的平均和极端外部测量数据，

[ɑː(r); ə(r)][æz; əz] [fˈɒləʊz] : [ˈtəʊt(ə)l][leŋkθ; leŋθ] , - (- - -) ; [leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][teɪl] -
are as follows : Total length , 110 (109 - 112) ; length of tail -
是 作为 跟随 : 全部的 长度 , - (- - -) ; 长度 的 尾巴 -
[ˈvəːtɪbrə; ˈvɜːtɪbreɪ] , - . [ˌtuːˈtuː] (- - -) ; [leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][haɪnd] [fʊt] , - . [eit] (- - -) .
vertebrae , 24 . 2 (22 - 26) ; length of hind foot , 13 . 8 (13 - 14) .
椎骨 , - . 2 (- - -) ; 长度 的 后 脚 , - . 8 (- - -) .

具体如下：总长度，110（109-112）；尾椎长度，24.2（22-26）；后足长度，13.8（13-14）。

[əˈnʌðə(r)] [ˈspesɪmən] [frɒm; frəm][θriː][miː] . [es] , [wʌn] - [wʌn] / [ˌtuːˈtuː][miː] . [iː][ɒv; əv][pəˈruː] , [ˈnɛməˌhɑː]
Another specimen from 3 mi . S , 1 - 1 / 2 mi . E of Peru , Nemaha
其他 标本 从 3 米 . S , 1 - 1 / 2 米 . E 的 秘鲁 , 内马哈
[ˈkaʊnti] ,
County ,
县 ,

另一件标本来自内马哈县秘鲁以南 3 英里、以东 1.5 英里处。

[ˈɔːlsəʊ][ɪz][rɪˈfɜːrəbl; ˈrefrəbl][tuː; tə][ˌkærəlɪˈnɛnsɪs] .
also is referable to carolinensis .
还 是 可参考的 到 卡罗莱纳 .

也可指卡罗莱纳人。

[ðiːz] [ˈriːs(ə)nt] [ˈrekɔːdz] [ˈɪndɪkeɪt] [ðæt] [ðə; ði][reɪndʒ][ɒv; əv][biː] . [biː] . [ˌkærəlɪˈnɛnsɪs][ɪkˈstendz; ek-][ʌp]
These recent records indicate that the range of B . b . carolinensis extends up
这些 最近的 记录 表明 那 这 范围 的 B . b . 卡罗莱纳 扩展 向上
[ðə; ði] [mɪˈzʊəri] [ˈrɪvə(r)] [ˈvæli] ,
the Missouri River Valley ,
这 密苏里州 河 谷 ,

这些最新记录表明，卡罗来纳熊蜂（B. b. carolinensis）的分布范围向上游延伸至密苏里河谷。

[ə'prɒksɪmətli] [tuː; tə] [nə'bræskə] ['sɪti] , ['oʊtoʊiː] ['kaʊnti] .
approximately to Nebraska City , Otoe County .
大约 到 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 .

大约到内布拉斯加城，奥托县。

[faɪv] ['spesəmən] [frɒm; frəm] ['luːivɪl] , [kæs] ['kaʊnti] , [ðə; ði][nekst] ['kaʊnti] ['nɔːθwəd] , [ə'lɒŋ] [ðə; ði] ['rɪvə(r)] ,
Five specimens from Louisville , Cass County , the next county northward , along the River ,
五 标本 从 路易斯维尔 , 卡斯 县 , 这 下一个 县 向北 , 沿着 这 河 ,

来自路易斯维尔、卡斯县（沿河向北的下一个县）的五个标本：

[ɑː(r); ə(r)][rɪ'fɜːrəbl; 'refrəbl][tuː; tə][biː] . [biː] . [ˌbrɛvɪ'kɔːdə] .
are referable to B . b . brevicauda .
是 可参考的 到 B . b . 短尾 .

可归类为 B. b. brevicauda。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['fʌskəs] .
Eptesicus fuscus fuscus .
eptesicus 褐藻 褐藻 .

Eptesicus fuscus fuscus.

([boʊ'vwɑː]) .
(Beauvois) .
(博瓦) .

（博瓦）

[bɪg] [braʊn] [bæt] . — [wʌn] [bɪg] [braʊn] [bæt][wɒz; wəz] [əb'teɪnd] [ɒn][dʒʊ'laɪ] - , - ,
Big Brown Bat . — One big brown bat was obtained on July 23 , 1952 ,
大的 棕色的 蝙蝠 . — 一 大的 棕色的 蝙蝠 曾是 获得 在 七月 - , - ,

大棕蝠——1952年7月23日，人们获得了一只大棕蝠。

[frɒm; frəm][wʌn] [maɪl] [west] [ɒv; əv][ˌnaɪə'brɑːrə] , [nɒks] ['kaʊnti] .
from one mile west of Niobrara , Knox County .
从 一 英里 西方 的 尼奥布拉拉 , 诺克斯 县 .

从诺克斯县尼奥布拉拉以西一英里处出发。

[waɪl] [nɒt][səʊ] [dɑːk] [ɪn]['dɔːs(ə)l][ˌkʌlə'reɪʃ(ə)n][æz; əz][sʌm; səm] ['spesəmən] [ɒv; əv][iː] . [ef] . ['fʌskəs]
While not so dark in dorsal coloration as some specimens of E . f . fuscus
尽管 不是 所以 黑暗的 在 背侧 着色 作为 一些 标本 的 E . f . 褐藻
[frɒm; frəm] ['iːstən] [nə'bræskə] ([kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi] ['kaunti]) ,
from eastern Nebraska (Cass and Sarpy counties) ,
从 东 内布拉斯加州 (卡斯 和 萨尔皮 县) ,

虽然背部颜色不像内布拉斯加州东部（卡斯县和萨皮县）的一些 E. f. fuscus 标本那样深，

[ðɪs] ['spesɪmən] [ɪz] ['nəʊtɪsəbli] [dɑːkə] [ðæn; ðən][ə; eɪ]['sɪəriːz][ɒv; əv][iː] . [ef] . ['pælɪdəs][frɒm; frəm][ˌef 'tiː] .
this specimen is noticeably darker than a series of E . f . pallidus from Ft .
这 标本 是 明显地 较暗 比 一个 系列 的 E . f . 苍白球 从 福特 .
[ˌnaɪə'brɑːrə]['waɪldlaɪf]['refjuːdʒ] ,
Niobrara Wildlife Refuge ,
尼奥布拉拉 野生动物 避难所 ,

这个标本的颜色明显比来自尼奥布拉拉堡野生动物保护区的一系列淡色拟哲水蚤（E. f. pallidus）要深。

[fɔːr][miː] . [iː][ɒv; əv]['væləntaɪn] , ['tʃeri] ['kaʊnti] ,
4 mi . E of Valentine , Cherry County ,
4 米 . E 的 情人节 , 樱桃 县 ,

位于切里县瓦伦丁以东 4 英里处

['biːɪŋ] [nɪə(r)] (- " [dʒeɪ]) [snʌf] [braʊn] [æz; əz] [ə'pəʊzd] [tuː; tə][nɪə(r)] (- - [ai]) ['bʌkθɔːn] [braʊn] .
being near (16 " j) Snuff Brown as opposed to near (16 ' i) Buckthorn Brown .
存在 靠近 (- " j) 鼻烟 棕色的 作为 反对 到 靠近 (- - 我) 鼠李 棕色的 .

靠近（16" j）Snuff Brown，而不是靠近（16' i）Buckthorn Brown。

['priːviəs] [tuː; tə][ðə; ði] ['teɪkɪŋ] [ɒv; əv] [ðɪs] ['spesɪmən] , [web] [ænd; ənd][dʒəunz] (- :
Previous to the taking of this specimen , Webb and Jones (1952 :
以前的 到 这 采取 的 这 标本 , 韦伯 和 琼斯 (- :

在采集该标本之前，Webb 和 Jones (1952:

-) [rɪ'pɔːtɪd] [æz; əz][iː] . [ef] . ['pælɪdəs][ə; eɪ]['spesɪmən] , [seɪvd] [æz; əz][ə; eɪ] [skʌl] ['əʊnli] ,
277) reported as E . f . pallidus a specimen , saved as a skull only ,
-) 据报道 作为 E . f . 苍白球 一个 标本 , 已保存 作为 一个 颅骨 仅有的 ,

277）被报道为苍白埃氏体（E. f. pallidus），该标本仅保存了头骨。

[wɪtʃ] [wɒz; wəz] [pɪkt] [ʌp] [ded] [æt; ət][ˌnaɪə'brɑːrə] .
which was picked up dead at Niobrara .
哪个 曾是 挑选 向上 死的 在 尼奥布拉拉 .

在尼奥布拉拉发现的那具尸体。

[ˌaɪ 'tiː] [siːm] [best] [tuː; tə] [ə'saɪn] [ðiːz] [tuː] [bæts][frɒm; frəm][ðə; ði][və'sɪnəti][ɒv; əv][ˌnaɪə'brɑːrə] ,
It seems best to assign these two bats from the vicinity of Niobrara ,
它 似乎 最好的 到 分配 这些 二 蝙蝠 从 这 附近 的 尼奥布拉拉 ,

似乎最好将这两只蝙蝠归类于尼奥布拉拉附近。

[nɒks] ['kaʊnti] , [tuː; tə][iː] . [ef] . ['fʌskəs] .
Knox County , to E . f . fuscus .
诺克斯 县 , 到 E . f . 褐藻 .

诺克斯县，至 E. f. fuscus。

[saɪ'jʊərəs][ˌkærəlɪ'nɛnsɪs][ˌkærəlɪ'nɛnsɪs]['gmeɪlɪn] .
Sciurus carolinensis carolinensis Gmelin .
松鼠 卡罗莱纳 卡罗莱纳 格梅林 .

卡罗莱松松鼠 carolinensis Gmelin。

[greɪ] ['skwɪrəl] . — [æn; ən]['ædʌlt; ə'dʌlt] [meɪl] [greɪ] ['skwɪrəl] [ʃɒt] [baɪ]['mɪstə(r)] . ['teri] [ə; eɪ] . [vɔːn]
Gray Squirrel . — An adult male gray squirrel shot by Mr . Terry A . Vaughan
灰色的 松鼠 . — 一个 成人 男性 灰色的 松鼠 射击 经过 先生 . 特里 一个 . 沃恩
[ɪn][ðə; ði] ['hevɪli] ['tɪmbəd] [blʌf] [ɒv; əv][ðə; ði] [mɪ'zʊəri] ['rɪvə(r)] ,
in the heavily timbered bluffs of the Missouri River ,
在 这 重度 木材 悬崖 的 这 密苏里州 河 ,

灰松鼠——一只成年雄性灰松鼠，由特里·A·沃恩先生在密苏里河树木茂密的悬崖上射杀。

[θriː][miː] . [es] , [ˌtuː'tuː][miː] .
3 mi . S , 2 mi .
3 米 . S , 2 米 .

南 3 英里，2 英里

[iː][ɒv; əv] [nə'bræskə] ['sɪti] , ['oʊtoʊiː] ['kaʊnti] , [ɒn][ɒk'təʊbə(r)] - , - ,
E of Nebraska City , Otoe County , on October 10 , 1953 ,
E 的 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 , 在 十月 - , - ,

1953 年 10 月 10 日，内布拉斯加州奥托县东部，

[prə'vaɪdz] [ðə; ði]['əʊnli][mju'ziːəm] ['spesɪmən] [ɒv; əv][ə; eɪ] [greɪ] ['skwɪrəl] [frɒm; frəm] [nə'bræskə] [nəʊn]
provides the only museum specimen of a gray squirrel from Nebraska known
提供 这 仅有的 博物馆 标本 的 一个 灰色的 松鼠 从 内布拉斯加州 已知
[tuː; tə][ˌem 'iː] .
to me .
到 我 .

这是据我所知内布拉斯加州唯一的灰松鼠博物馆标本。

['rezɪdənts] [ɪn][ðə; ði]['eəriə] [kən'sɜːnd] [rɪ'pɔːt] [smɔːl] ['nʌmbəz] [ɒv; əv] [ðɪs] ['skwɪrəl] [æz; əz] [stɪl]
Residents in the area concerned report small numbers of this squirrel as still
居民 在 这 区域 担心的 报告 小的 数字 的 这 松鼠 作为 仍然
[ə'kɜːrɪŋ] [ɒn][ðə; ði] ['hevɪli] ['wʊdɪd] [blʌf] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] [mɪ'zʊəri] ['rɪvə(r)][ɪn]['nɛməˌhɑː] ,
occurring on the heavily wooded bluffs along the Missouri River in Nemaha ,
发生 在 这 重度 树木繁茂的 悬崖 沿着 这 密苏里州 河 在 内马哈 ,

内马哈地区居民报告称，在密苏里河沿岸树木茂密的悬崖上，仍然可以看到少量这种松鼠的踪迹。

['oʊtoʊiː][ænd; ənd] ['rɪtʃədsən] ['kaunti] , [nə'bræskə] , [æt; ət] [liːst] [æz; əz][fɑː(r)] [nɔːθ] [æz; əz]
Otoe and Richardson counties , Nebraska , at least as far north as
奥托 和 理查森 县 , 内布拉斯加州 , 在 至少 作为 远的 北 作为
[nə'bræskə] ['sɪti] .
Nebraska City .
内布拉斯加州 城市 .

内布拉斯加州的奥托县和理查森县，至少北至内布拉斯加城。

[greɪ] ['skwirəlz] [frɒm; frəm] [nə'bræskə] [hæv; həv] [biːn] [rɪ'pɔːtɪd] [twaɪs] [bɪ'fɔː(r)] [ɪn][ðə; ði]
Gray squirrels from Nebraska have been reported twice before in the
灰色的 松鼠 从 内布拉斯加州 有 到过 据报道 两次 前 在 这
['lɪtrətʃə(r); 'lɪtərətʃə][æz; əz] [f'ɒləʊz] :
literature as follows :
文学 作为 跟随 :

此前文献中曾两次报道过内布拉斯加州的灰松鼠，具体如下：

" [maʊθ] [ɒv; əv] [plæt] [['rɪvə(r)]] " ([bɛəd] , - : -) [ænd; ənd][bə'rɑːdə] , ['rɪtʃədsən] ['kaʊnti] (
" Mouth of Platte [River] " (Baird , 1858 : 262) and Barada , Richardson County (
" 嘴 的 普拉特 [河] " (贝尔德 , - : -) 和 巴拉达 , 理查森 县 (
[dʒəunz][ænd; ənd] [web] , - : -) .
Jones and Webb , 1949 : 312) .
琼斯 和 韦伯 , - : -) .

“普拉特河口”（Baird，1858 年：262）和理查森县巴拉达（Jones 和 Webb，1949 年：312）。

- (- : -) , [waɪl] ['lɪstɪŋ] [nəʊ]['æktʃuəl] ['rekɔːdz] , [sez] [ɒv; əv] [ðɪs] ['skwɪrəl] ,
Swenk (1908 : 80) , while listing no actual records , says of this squirrel ,
- (- : -) , 尽管 列表 不 实际的 记录 , 说道 的 这 松鼠 ,

斯温克（1908：80）虽然没有列出任何实际记录，但他这样描述这只松鼠：

" ['kɒmən] [ɪn][ðə; ði]['tɪmbə(r)] [ə'lɒŋ] ['wɔːtəkɔːsiz] [ɒv; əv] [ˌsaʊθ'iːstən]
" Common in the timber along watercourses of southeastern
" 常见的 在 这 木材 沿着 水道 的 东南部

在东南部的水道沿岸林地中很常见

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 483]
[页 -]

[第483页]

[nə'bræskə] , [bʌt; bət] ['greɪtli] [aʊt'nʌmbəd] ['evriweə(r)] [baɪ] [[saɪ'jʊərəs][niː'ʒeə(r)]] - .
Nebraska , but greatly outnumbered everywhere by [Sciurus niger] rufiventer .
内布拉斯加州 , 但 非常 寡不敌众 到处 经过 [松鼠 尼日尔] - .

内布拉斯加州，但在其他地方，[Sciurus niger] rufiventer 的数量远远少于它们。

[ai][hæv; həv][nəʊ] ['rekɔːdz] [west] [ɒv; əv][ðə; ði] 97th [mə'rɪdiən] [nɔː(r)] [nɔːθ] [ɒv; əv][ðə; ði] [plæt] .
I have no records west of the 97th meridian nor north of the Platte .
我 有 不 记录 西方 的 这 97th 子午线 也不 北 的 这 普拉特 .

我没有西经97度以西或普拉特河以北的记录。

" [spɜːr'mɑːfɪləs] - (['sæbain]) .
" Spermophilus franklinii (Sabine) .
" 嗜精菌 - (萨宾) .

“Spermophilus franklinii (Sabine).

['fræŋklɪn] [graʊnd] ['skwɪrəl] . — [ə; eɪ] ['spesɪmən] [frɒm; frəm][ˌtuː'tuː][miː] . [ˌɛn'dʌbəljuː][ɒv; əv]['lɪskoʊ] , [ɪn]
Franklin Ground Squirrel . — A specimen from 2 mi . NW of Lisco , in
富兰克林 地面 松鼠 . — 一个 标本 从 2 米 . 西北 的 利斯科 , 在
['mɔːrɪl] ['kaʊnti] ([ˌɛn'ɛs'ɛm] -) ,
Morrill County (NSM 3324) ,
莫里尔 县 (国家安全机制 -) ,

富兰克林地松鼠——标本采自莫里尔县利斯科西北2英里处（NSM 3324）。

[ɪk'stendz; ek-][ðə; ði] [nəʊn] [ˌdʒiːə'græfɪk] [reɪndʒ][ɒv; əv][es] . - [ə'prɒksɪmətli] - [maɪlz]
extends the known geographic range of S . franklinii approximately 200 miles
扩展 这 已知 地理 范围 的 S . - 大约 - 英里
['westwəd] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] [plæt] ['rɪvə(r)] ['væli] [frɒm; frəm] ['kɑːrni] ,
westward along the Platte River Valley from Kearney ,
向西 沿着 这 普拉特 河 谷 从 科尔尼 ,

已知 S. franklinii 的地理分布范围沿普拉特河谷向西延伸约 200 英里，从 Kearney 开始。

['bʌfələʊ] ['kaʊnti] ([siː] ['haʊəl] , - : -) ,
Buffalo County (see Howell , 1938 : 134) ,
水牛 县 (看 豪厄尔 , - : -) ,

布法罗县（参见 Howell，1938：134），

[ænd; ənd] [sə'dʒests] [ə; eɪ] ['westwəd] ['muːvmənt] [ɒv; əv] [ðɪs] [graʊnd] ['skwɪrəl] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] [plæt]
and suggests a westward movement of this ground squirrel along the Platte
和 建议 一个 向西 移动 的 这 地面 松鼠 沿着 这 普拉特
['rɪvə(r)][ɪn]['riːs(ə)nt] [j'iəz] .
River in recent years .
河 在 最近的 年 .

这表明近年来这种地松鼠沿着普拉特河向西迁徙。

[ˌpɛroʊ'nɑːθəs] [flə'vɛsənz] [flə'vɛsənz] ['mɛriəm] .
Perognathus flavescens flavescens Merriam .
佩罗格纳图斯 黄花 黄花 梅里亚姆 .

黄鳍齿甲（Perognathus flavescens flavescens Merriam.）

[pleɪnz] ['pɒkɪt] [maʊs] . — [piː] . [ef] . [flə'vɛsənz] [ə'kɜːz] [ɪn][ðə; ði][sænd] [hɪlz] [ænd; ənd][ə'dʒeɪs(ə)nt]
Plains Pocket Mouse . — P . f . flavescens occurs in the Sand Hills and adjacent
平原 口袋 老鼠 . — P . f . 黄花 发生 在 这 沙 丘陵 和 邻近的
[mɪkst] - [grɑːs] [pleɪnz] [ɒv; əv] ['sentrəl] [nə'bræskə] .
mixed - grass plains of central Nebraska .
混合 - 草 平原 的 中央 内布拉斯加州 .

平原口袋鼠——P. f. flavescens 分布于内布拉斯加州中部的沙丘和邻近的混生草平原。

['iːstən] ['mɑːdʒɪn(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] [ɑː(r); ə(r)] : ['niːlaɪ] , ['æntɪləʊp] ['kaʊnti] , [ˌtuː'tuː] (
Eastern marginal records of occurrence are : Neligh , Antelope County , 2 (
东 边缘 记录 的 发生 是 : 内利格 , 羚羊 县 , 2 (
[ɛmviːz][wʌn] , [ˌɛn'ɛs'ɛm] [wʌn]) ;
MVZ 1 , NSM 1) ;
MVZ 1 , 国家安全机制 1) ;

东部边缘记录的发生情况有：内利格，羚羊县，2（MVZ 1，NSM 1）；

[wʌn][miː] . [iː][ɒv; əv] [rə'venə] , ['bʌfələʊ] ['kaʊnti] , [ˌtuː'tuː] ([ɛm'ziː]) ; [ʌn'spesɪfaɪd] [ləʊ'kæləti][ɪn]['ædəmz]
1 mi . E of Ravenna , Buffalo County , 2 (MZ) ; unspecified locality in Adams
1 米 . E 的 拉文纳 , 水牛 县 , 2 (MZ) ; 未指定 地点 在 亚当斯
['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌeɪtʃ 'em]) .
County , 1 (HM) .
县 , 1 (HM) .

布法罗县拉文纳以东 1 英里，2 (MZ)；亚当斯县未指明地点，1 (HM)。

[ˌpɛroʊ'nɑːθəs] [flə'vɛsənz] - ['ɒsˌgʊd] .
Perognathus flavescens perniger Osgood .
佩罗格纳图斯 黄花 - 奥斯古德 .

Perognathus flavescens perniger Osgood.

[pleɪnz] ['pɒkɪt] [maʊs] . — [ðɪs] [maʊs] [ə'kɜːz] [ɪn] [ˌnɔːθ'iːstən] [nə'bræskə] .
Plains Pocket Mouse . — This mouse occurs in northeastern Nebraska .
平原 口袋 老鼠 . — 这 老鼠 发生 在 东北部 内布拉斯加州 .

平原口袋鼠——这种老鼠分布于内布拉斯加州东北部。

['ɒsˌgʊd] (- : -) , [ɪn][ðə; ði][ə'rɪdʒən(ə)l] [dɪ'skrɪpʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] ['sʌbspiːʃiːz] , ['lɪstɪd] [tuː]
Osgood (1904 : 127) , in the original description of the subspecies , listed two
奥斯古德 (- : -) , 在 这 原来的 描述 的 这 亚种 , 列出 二
['spesəmən] [frɒm; frəm]['vɜːdɪgriː; 'vɜːdɪgriːs] [['vɜːrdɪˌgriː]] ,
specimens from Verdigris [Verdigre] ,
标本 从 铜绿 [铜绿] ,

Osgood（1904：127）在对该亚种的原始描述中，列出了来自 Verdigris [Verdigre] 的两个标本，

[nɒks] ['kaʊnti] .
Knox County .
诺克斯 县 .

诺克斯县。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] [ɑː(r); ə(r)] : ['biːmə] , ['kʌmɪŋ] ['kaʊnti] , [ˌtuː'tuː] (['juːˌɛs'biːz]) ;
Additional records of occurrence are : Beemer , Cuming County , 2 (USBS) ;
额外的 记录 的 发生 是 : 宝马 , 库明 县 , 2 (USB接口) ;
[wʌn] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [ˌes'iː][ɒv; əv][ˌnaɪə'brɑːrə] ,
1 - 1 / 2 mi . SE of Niobrara ,
1 - 1 / 2 米 . 东南 的 尼奥布拉拉 ,

其他发生记录包括：比默，卡明县，2（USBS）；尼奥布拉拉东南 1.5 英里处，

[nɒks] ['kaʊnti] , [θriː] ; [wʌn] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [es][ɒv; əv] ['pɪlgə] , ['stæntən] ['kaʊnti] , [ˌtuː'tuː] .
Knox County , 3 ; 1 - 1 / 2 mi . S of Pilger , Stanton County , 2 .
诺克斯 县 , 3 ; 1 - 1 / 2 米 . S 的 皮尔格 , 斯坦顿 县 , 2 .

诺克斯县，3；位于斯坦顿县皮尔格以南 1.5 英里处，2。

[ðə; ði] [tuː] ['spesəmən] [frɒm; frəm] ['biːmə] [ɑː(r); ə(r)]['tɪpɪk(ə)l] - .
The two specimens from Beemer are typical perniger .
这 二 标本 从 宝马 是 典型的 - .

来自比默的两个标本是典型的 perniger。

[ɔːl] [ɒv; əv][ðə; ði]['ʌðə(r)] [nɪ'bræskən] ['spesəmən] [ɑː(r); ə(r)] ['ɪntəˌgreɪd] [bɪ'twiːn] [piː] . [ef] . [flə'vɛsənz] ,
All of the other Nebraskan specimens are intergrades between P . f . flavescens ,
全部 的 这 其他 内布拉斯加州 标本 是 中间级 之间 P . f . 黄花 ,
[ˌdʒiːə'græfɪkli] [ə'dʒeɪs(ə)nt][tuː; tə][ðə; ði] [west] ,
geographically adjacent to the west ,
地理上 邻近的 到 这 西方 ,

内布拉斯加州的其他所有标本都是与西部地理位置相邻的 P. f. flavescens 之间的过渡类型。

[ænd; ənd][piː] . [ef] . - [tuː; tə][ðə; ði] [iːst] [bʌt; bət][ɑː(r); ə(r)] [best] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] - [ɒn]
and P . f . perniger to the east but are best referred to perniger on
和 P . f . - 到 这 东方 但 是 最好的 指 到 - 在
[ðə; ði]['beɪsɪs][ɒv; əv]['greɪtə(r)]['təʊt(ə)l][leŋkθ; leŋθ] ,
the basis of greater total length ,
这 基础 的 更大的 全部的 长度 ,

东部有 P. f. perniger，但根据其总长度更大，最好将其归为 perniger。

['lɑːdʒə(r)]['kreɪniəl] ['meʒəm(ə)nts] [ænd; ənd] [dɑːkə] ['dɔːs(ə)l][ˌkʌlə'reɪʃ(ə)n] .
larger cranial measurements and darker dorsal coloration .
更大的 颅骨 测量 和 较暗 背侧 着色 .

颅骨尺寸较大，背部颜色较深。

[piː] . [ef] . - [wɒz; wəz][ə'rɪdʒənəli] [dɪ'skraɪbd] (['ɒsˌgʊd] , [ɒp] . [sɪt] .)
P . f . perniger was originally described (Osgood , op . cit .)
P . f . - 曾是 起初 描述 (奥斯古德 , 操作 . 引用 .)

P. f. perniger 最初由（Osgood，同上）描述。

[ɒn][ðə; ði]['beɪsɪs][ɒv; əv][ɪts] [dɑːkə] ['dɔːs(ə)l][ˌkʌlə'reɪʃ(ə)n][ænd; ənd] [ɪn'krəʊtʃmənt] [ɒv; əv][ðə; ði]['lætərəl]
on the basis of its darker dorsal coloration and encroachment of the lateral
在 这 基础 的 它是 较暗 背侧 着色 和 侵犯 的 这 侧
[laɪn][ɒn][ðə; ði][pɒ'stɪəriə(r)] [pɑːts] [ɒv; əv][ðə; ði]['ventə(r)] .
line on the posterior parts of the venter .
线 在 这 后部 部分 的 这 腹部 .

根据其较深的背部颜色和侧线向腹部后部的延伸情况判断。

[ðə; ði]['lætə(r)]['kærəktə(r)][ɪz][nɒt]['prez(ə)nt][ɪn][ɔːl] [nɪ'bræskən] ['spesəmən] .
The latter character is not present in all Nebraskan specimens .
这 后者 特点 是 不是 展示 在 全部 内布拉斯加州 标本 .

后一种特征并非所有内布拉斯加州标本都具有。

[maɪs][frɒm; frəm][ðə; ði] [tuː] [ləʊ'kælitiz][ɪn] [nɒks] ['kaʊnti] [hæv; həv] ['bʌfi] ['ʌndəpɑːt] ;
Mice from the two localities in Knox County have buffy underparts ;
小鼠 从 这 二 地方 在 诺克斯 县 有 吸血鬼猎人巴菲 下半身 ;

来自诺克斯县这两个地区的鼠类腹部呈淡黄色;

[ðəʊz] [frɒm; frəm]['ʌðə(r)] [nɪ'bræskən] [ləʊ'kælitiz][duː; də][nɒt] .
those from other Nebraskan localities do not .
那些 从 其他 内布拉斯加州 地方 做 不是 .

来自内布拉斯加州其他地区的人则没有这种待遇。

[ɒv; əv][naɪn] ['spesəmən] [ɒv; əv][piː] . [ef] . - [ɪg'zæmɪnd] [frɒm; frəm] [elk]['rɪvə(r)] , ['ʃɜːrbərn]
Of nine specimens of P . f . perniger examined from Elk River , Sherburne
的 九 标本 的 P . f . - 检查 从 麋鹿 河 , 舍伯恩
['kaʊnti] ,
County ,
县 ,

在对来自舍伯恩县埃尔克河的九个 P. f. perniger 标本进行检查后发现,

[ˌmɪnɪ'səʊtə] , [nʌn] [hæz; həz] ['bʌfi] ['ʌndəpɑːt] [ˌweər'æz] [ə; eɪ] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] ['rændɒlf]
Minnesota , none has buffy underparts whereas a specimen from Randolph
明尼苏达州 , 没有任何 有 吸血鬼猎人巴菲 下半身 然而 一个 标本 从 兰道夫
, ['friːmɒnt] ['kaʊnti] , ['aɪəwə] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) [dʌz] .
, Fremont County , Iowa (NSM) does .
, 弗里蒙特 县 , 爱荷华州 (国家安全机制) 做 .

明尼苏达州的标本都没有淡黄色的下体,而爱荷华州弗里蒙特县兰道夫的标本(NSM)则有淡黄色的下体。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] , [ɪn] [tuː] [ɒv; əv] [faɪv] ['spesəmən] [ɒv; əv] [piː] . [ef] . [flə'vɛsənz] [frɒm; frəm]['kɛlsoʊ] ,
In addition , in two of five specimens of P . f . flavescens from Kelso ,
在 添加 , 在 二 的 五 标本 的 P . f . 黄花 从 凯尔索 ,

此外,在凯尔索采集的五个黄花拟南芥标本中,有两个标本中也发现了黄花拟南芥。

['hʊkə(r)] ['kaʊnti] , ([ɛm'ziː]) [ðə; ði]['lætərəl][laɪn] [ɪn'krəʊtʃ] [ɒn][ðə; ði] ['ʌndəpɑːt] .
Hooker County , (MZ) the lateral line encroaches on the underparts .
妓女 县 , (MZ) 这 侧 线 侵占 在 这 下半身 .

胡克县(MZ)侧线侵占下体。

[ðə; ði] [ɪn'krəʊtʃmənt] [ɒv; əv][ðə; ði]['lætərəl][laɪn][ɒn][ðə; ði] ['ʌndəpɑːt] , [ɔː(r)]['feɪljə(r)][ɒv; əv][ðə; ði][laɪn]
The encroachment of the lateral line on the underparts , or failure of the line
这 侵犯 的 这 侧 线 在 这 下半身 , 或者 失败 的 这 线
[tuː; tə][duː; də][səʊ] ,
to do so ,
到 做 所以 ,

侧线侵占下体,或侧线未能侵占下体,

[ɪz] [θɔːt] [tuː; tə][biː; bi]['əʊnli][æn; ən][ˌɪndɪ'vɪdʒuəl][ˌveəri'eɪʃ(ə)n][ænd; ənd][ɒv; əv][nəʊ][ˌtæksə'nɒmɪk][juːz] .
is thought to be only an individual variation and of no taxonomic use .
是 想法 到 是 仅有的 一个 个人 变化 和 的 不 分类学 使用 .

被认为只是个体差异,没有分类学意义。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 484]
[页 -]

[第484页]

[ˌpɛroʊ'nɑːθəs] ['fleɪvəs] - [gəuld,mən] .
Perognathus flavus piperi Goldman .
佩罗格纳图斯 黄 - 高盛 .

Perognathus flavus piperi Goldman.

['bʌfi] ['pɒkɪt] [maʊs] . — [ɪn][ðə; ði] [dɪ'skrɪpʃn] [ɒv; əv][piː] . [ef] . - , ['kɒkrəm] (- :
Buffy Pocket Mouse . — In the description of P . f . bunkeri , Cockrum (1951 :
吸血鬼猎人巴菲 口袋 老鼠 . — 在 这 描述 的 P . f . - , 考克伦 (- :
-) ['æləkeɪtɪd; 'æloʊkeɪtɪd][tuː; tə][ðə; ði] [njuː] ['sʌbspiːʃiːz] ,
206) allocated to the new subspecies ,
-) 分配 到 这 新的 亚种 ,

巴菲口袋鼠——在对 P. f. bunkeri 的描述中，Cockrum (1951: 206) 将这一新亚种归入其中。

[wɪ'ðaʊt] ['kɒment] , [ə; eɪ] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] [ə'laɪəns] , [bɒks] [bjuːt] ['kaʊnti] .
without comment , a specimen from Alliance , Box Butte County .
没有 评论 , 一个 标本 从 联盟 , 盒子 比尤特 县 .

未加评论，标本来自宾夕法尼亚州博克斯比特县联盟镇。

[ai][hæv; həv] [ɪg'zæmɪnd] [ðɪs] ['spesɪmən] [ə'lɒŋ] [wɪð] [ɔːl]['ʌðə(r)] [nɪ'bræskən] ['spesəmən] [nəʊn] [tuː; tə]
I have examined this specimen along with all other Nebraskan specimens known to
我 有 检查 这 标本 沿着 和 全部 其他 内布拉斯加州 标本 已知 到
[ˌem 'iː][ænd; ənd] ,
me and ,
我 和 ,

我已将此标本与我所知的所有其他内布拉斯加州标本一起进行检查，并且，

[ɔːl'ðəʊ] [ɔːl] [ə'prəʊtʃ] - [ɪn]['kreɪniəl] ['meʒəm(ə)nts] ,
although all approach bunkeri in cranial measurements ,
虽然 全部 方法 - 在 颅骨 测量 ,

尽管所有方法都接近颅骨测量，

[ðeɪ] [siːm] [best] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] - [ɒn][ðə; ði]['beɪsɪs][ɒv; əv] [dɑːkə] ['dɔːs(ə)l][ˌkʌlə'reɪʃ(ə)n][ænd; ənd]
they seem best referred to piperi on the basis of darker dorsal coloration and
他们 似乎 最好的 指 到 - 在 这 基础 的 较暗 背侧 着色 和
['lɑːdʒə(r)][ɪk'stɜːn(ə)l] ['meʒəm(ə)nts] .
larger external measurements .
更大的 外部的 测量 .

根据较深的背部颜色和较大的外部尺寸，它们似乎最适合归类为 piperi。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] , ['sevrəl] [ɒv; əv][ðem; ðəm]['mɑːdʒɪn(ə)l][tuː; tə][ðə; ði] ['iːstwəd] ,
Additional records of occurrence , several of them marginal to the eastward ,
额外的 记录 的 发生 , 一些 的 他们 边缘 到 这 向东 ,
[ɑː(r); ə(r)] : - [miː] . [es][ɒv; əv] ['æntɪˌɒk] ,
are : 10 mi . S of Antioch ,
是 : - 米 . S 的 安提阿 ,

其他出现记录，其中一些位于东部边缘，包括：安提阿以南 10 英里处，

['gɑːd(ə)n] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ɛm'ziː]) ; ['kɛlsoʊ] , ['hʊkə(r)] ['kaʊnti] , [fɔːr] ([ɛm'ziː]) ; [faɪv][miː] . [en][ɒv; əv]
Garden County , 1 (MZ) ; Kelso , Hooker County , 4 (MZ) ; 5 mi . N of
花园 县 , 1 (MZ) ; 凯尔索 , 妓女 县 , 4 (MZ) ; 5 米 . N 的
['brɪdʒpɔːt] ,
Bridgeport ,
布里奇波特 ,

加登县，1 (MZ)；胡克县凯尔索，4 (MZ)；布里奇波特以北 5 英里，

['mɔːrɪl] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ɛmviːz]) ; [sɪks][miː] . [en][ɒv; əv] ['mɪtʃəl] , [skɑːts] [blʌf] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) .
Morrill County , 1 (MVZ) ; 6 mi . N of Mitchell , Scotts Bluff County , 1 (NSM) .
莫里尔 县 , 1 (MVZ) ; 6 米 . N 的 米切尔 , 斯科茨 虚张声势 县 , 1 (国家安全机制) .

莫里尔县，1（MVZ）；米切尔以北 6 英里，斯科茨布拉夫县，1（NSM）。

[ə; eɪ] ['spesɪmən] [nɒt] [siːn] [baɪ][ˌem 'iː] [ðæt] [wɒz; wəz] [rɪ'pɔːtɪd] [frɒm; frəm] ['væləntaɪn] , ['tʃeri] ['kaʊnti] ([biːd] ,
A specimen not seen by me that was reported from Valentine , Cherry County (Beed ,
一个 标本 不是 已见 经过 我 那 曾是 据报道 从 情人节 , 樱桃 县 (比德 ,

据报道，在切里县瓦伦丁（比德县）发现了一个我没有亲眼见过的标本。

- : -) , [ɪz] [prɪ'zjuːməbli] ['ɔːlsəʊ] [best] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə][piː] . [ef] . - .
1936 : 21) , is presumably also best referred to P . f . piperi .
- : -) , 是 想必 还 最好的 指 到 P . f . - .

1936: 21)，大概也最好是指 P. f. piperi。

[nəʊ] ['spesəmən] [ɒv; əv][piː] . ['fleɪvəs][ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [tuː; tə][ˌem 'iː][frɒm; frəm] [saʊθ] [ɒv; əv][ðə; ði] [plæt] ['rɪvə(r)][ɪn] [ˌsaʊθ'westən] [nə'bræskə] [ɔːl'ðəʊ] [ðeɪ] ['prɒbəbli] [ə'kɜː(r)][ðeə(r)] .
No specimens of P . flavus are known to me from south of the Platte River in southwestern Nebraska although they probably occur there .
不 标本 的 P . 黄 是 已知 到 我 从 南 的 这 普拉特 河 在 西南 内布拉斯加州 虽然 他们 大概 发生 那里 .

虽然我知道内布拉斯加州西南部普拉特河以南没有黄褐拟青霉的标本，但它们可能在那里存在。

[ɪf] [səʊ] , [ðeɪ] [meɪ] [biː; bi][rɪ'fɜːrəbl; 'refrəbl][tuː; tə][piː] . [ef] . - ,
If so , they may be referable to P . f . bunkeri ,
如果 所以 , 他们 可能 是 可参考的 到 P . f . - ,

如果是这样，它们可能与 P. f. bunkeri 有关。

[wɪtʃ] [ɪz] [faʊnd] [ɪn] ['kaunti] [ɒv; əv]['kænzəs] [ə'dʒɔɪnɪŋ] [ðə; ði] [ˌsaʊθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [nə'bræskə] .
which is found in counties of Kansas adjoining the southwestern part of Nebraska .
哪个 是 成立 在 县 的 堪萨斯州 相邻的 这 西南 部分 的 内布拉斯加州 .

它位于堪萨斯州与内布拉斯加州西南部接壤的几个县。

[ˌpɛroʊ'nɑːθəs] ['hɪspɪdəs] [ˌpærə'dɑːksəs] ['mɛriəm] .
Perognathus hispidus paradoxus Merriam .
佩罗格纳图斯 粗毛 悖论 梅里亚姆 .

Perognathus hispidus paradoxus Merriam。

['hɪspɪd] ['pɒkɪt] [maʊs] . — [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ə'kɜːz] ['kɒmənli] [ɪn] ['sentrəl] - [ænd; ənd] ['westən] - [nə'bræskə] .
Hispid Pocket Mouse . — This subspecies occurs commonly in central - and western - Nebraska .
粗糙的 口袋 老鼠 . — 这 亚种 发生 通常 在 中央 - 和 西 - 内布拉斯加州 .

粗毛口袋鼠——该亚种常见于内布拉斯加州中部和西部。

['iːstən] ['mɑːdʒɪn(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] [ɑː(r); ə(r)] : [ˌtuː'tuː][miː] . [ˌes'iː][ɒv; əv][ˌnaɪə'brɑːrə] , [nɒks] ['kaʊnti] ,
Eastern marginal records of occurrence are : 2 mi . SE of Niobrara , Knox County ,
东 边缘 记录 的 发生 是 : 2 米 . 东南 的 尼奥布拉拉 , 诺克斯 县 ,

东部边缘分布记录为：诺克斯县尼奥布拉拉东南 2 英里处。

[wʌn] (-) ; [fɔːr][miː] . [iː] , [ˌtuː'tuː][miː] . [es][ɒv; əv][ɔːrd] , [wʌn] ; ['bleidən] , ['webstə(r)] ['kaʊnti] ,
1 (NGFPC) ; 4 mi . E , 2 mi . S of Ord , 1 ; Bladen , Webster County ,
1 (-) ; 4 米 . E , 2 米 . S 的 奥德 , 1 ; 布莱登 , 韦伯斯特 县 ,
[ˌtuː'tuː] ([ˌeɪtʃ 'em]) .
2 (HM) .
2 (HM) .

1 (NGFPC)；Ord 以东 4 英里，以南 2 英里，1；Bladen，韦伯斯特县，2 (HM)。

[ˌpɛroʊ'nɑːθəs] ['hɪspɪdəs] - ['mɛriəm] .
Perognathus hispidus spilotus Merriam .
佩罗格纳图斯 粗毛 - 梅里亚姆 .

Perognathus hispidus spilotus Merriam。

['hɪspɪd] ['pɒkɪt] [maʊs] . — [dʒəunz][ænd; ənd] [web] (- :
Hispid Pocket Mouse . — Jones and Webb (1949 :
粗糙的 口袋 老鼠 . — 琼斯 和 韦伯 (- :

毛茸茸的口袋鼠。——琼斯和韦伯（1949 年：

-) [fɜːst] [rɪ'pɔːtɪd] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ɪn] [nə'bræskə] [æz; əz][frɒm; frəm][faɪv][miː] . [ˌes'iː][ɒv; əv]['ruːloʊ] ,
312) first reported this subspecies in Nebraska as from 5 mi . SE of Rulo ,
-) 第一的 据报道 这 亚种 在 内布拉斯加州 作为 从 5 米 . 东南 的 鲁洛 ,
['rɪtʃədsən] ['kaʊnti] .
Richardson County .
理查森 县 .

312) 首次报道了内布拉斯加州的这一亚种，发现于理查森县鲁洛东南 5 英里处。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] [ɑː(r); ə(r)] : [θriː][miː] . [es 'dʌbljuː][ɒv; əv] ['bɑrnstən] , [geɪdʒ]
Additional records of occurrence are : 3 mi . SW of Barnston , Gage
额外的 记录 的 发生 是 : 3 米 . 西南 的 巴恩斯顿 , 盖奇
['kaʊnti] , [wʌn] (-) ;
County , 1 (NGFPC) ;
县 , 1 (-) ;

其他发生记录为：巴恩斯顿西南 3 英里，盖奇县，1（NGFPC）；

['benɪt] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) , [naɪn][miː] . [ˌɛn'dʌbəljuː][ɒv; əv] ['lɪŋkən] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) , [wʌn] - [wʌn] /
Bennet , 1 (NSM) , 9 mi . NW of Lincoln , 1 (NSM) , 1 - 1 /
贝内特 , 1 (国家安全机制) , 9 米 . 西北 的 林肯 , 1 (国家安全机制) , 1 - 1 /
[ˌtuː'tuː][miː] . [es][ɒv; əv] ['lɪŋkən] ,
2 mi . S of Lincoln ,
2 米 . S 的 林肯 ,

贝内特，1（NSM），林肯西北 9 英里，1（NSM），林肯以南 1.5 英里，

[wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) , ['læŋkəstə(r)] ['kaʊnti] ; [pə'ruː] , ['nɛməˌhɑː] ['kaʊnti] , [wʌn] (-) ; [θriː][miː] . [es] ,
1 (NSM) , Lancaster County ; Peru , Nemaha County , 1 (NGFPC) ; 3 mi . S ,
1 (国家安全机制) , 兰开斯特 县 ; 秘鲁 , 内马哈 县 , 1 (-) ; 3 米 . S ,
[ˌtuː'tuː][miː] .
2 mi .
2 米 .

1 (NSM)，兰开斯特县；秘鲁，内马哈县，1 (NGFPC)；南 3 英里，2 英里。

[iː][ɒv; əv] [nə'bræskə] ['sɪti] , ['oʊtoʊiː] ['kaʊnti] , [θriː] ; [bə'rɑːdə] , ['rɪtʃədsən] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm])
E of Nebraska City , Otoe County , 3 ; Barada , Richardson County , 1 (NSM)
E 的 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 , 3 ; 巴拉达 , 理查森 县 , 1 (国家安全机制)
; ['plez(ə)nt] [deɪl] ,
; Pleasant Dale ,
; 令人愉快的 戴尔 ,

内布拉斯加城东部，奥托县，3；巴拉达，理查森县，1（NSM）；普莱森特戴尔，

['suːərd] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) ; [wʌn][miː] . [es][ɒv; əv] ['wɪljəmz] , ['θeɪər] ['kaʊnti] , [wʌn] .
Seward County , 1 (NSM) ; 1 mi . S of Williams , Thayer County , 1 .
西沃德 县 , 1 (国家安全机制) ; 1 米 . S 的 威廉姆斯 , 泰耶 县 , 1 .

苏厄德县，1（NSM）；威廉姆斯以南 1 英里，泰耶县，1。

[glɑːs] (- : -) [rɪ'fɜːd] [ə; eɪ] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] [naɪn] [miː] . [ˌɛn'dʌbəljuː] [ɒv; əv] ['lɪŋkən] ,
Glass (1947 : 179) referred a specimen from 9 mi . NW of Lincoln ,
玻璃 (- : -) 指 一个 标本 从 9 米 . 西北 的 林肯 ,
['læŋkəstə(r)] ['kaʊnti] ,
Lancaster County ,
兰开斯特 县 ,

Glass（1947：179）提到了一份来自兰开斯特县林肯西北9英里的标本，

[tuː; tə] [piː] . [eɪtʃ] . [ˌpærə'dɑːksəs] .
to P . h . paradoxus .
到 P . h . 悖论 .

致 P. h. paradoxus。

[ɪn] [dɪ'skʌsɪŋ] [ðə; ði] [zəʊn] [ɒv; əv] [ɪntəgreɪ'deɪʃən] [bɪ'twiːn] - [ænd; ənd] [ˌpærə'dɑːksəs] ,
In discussing the zone of intergradation between spilotus and paradoxus ,
在 讨论 这 区 的 相干 之间 - 和 悖论 ,
[ˌdʒiːə'græfɪkli] [ə'dʒeɪs(ə)nt] [tuː; tə] [ðə; ði] [west] ,
geographically adjacent to the west ,
地理上 邻近的 到 这 西方 ,

在讨论位于西部的 spilotus 和 paradoxus 之间的过渡区域时，

[hiː; hi] [rəʊt] ([ɒp] .
he wrote (op .
他 写道 (操作 .

他写道（同上）。

[sɪt] . : -) , " [ˌaɪ 'tiː] [ɪz] ['evɪdənt] [ðæt] [ˌaɪ 'tiː] ['prəʊsiːdz] [ˌnɔːθ'iːstwədz] ,
cit . : 178) , " It is evident that it proceeds northeastwards ,
引用 . : -) , " 它 是 明显 那 它 收益 向东北方向 ,

引文：178），"很明显，它是向东北方向延伸的，

[tə'wɔːd] [ðə; ði] [mɪ'zʊəri] ['rɪvə(r)] [sɪns] [ˌtuː'tuː] ['spesəmən] [frɒm; frəm] ['iːstən] [nə'bræskə] ,
toward the Missouri River since 2 specimens from eastern Nebraska ,
朝向 这 密苏里州 河 自从 2 标本 从 东 内布拉斯加州 ,

自内布拉斯加州东部发现2个标本以来，人们一直朝着密苏里河方向研究。

[ə; eɪ] ['dʒuːvɪˌnaɪl] [frɒm; frəm] ['webstə(r)] ['kaʊnti] [ænd; ənd] [æn; ən] ['ædʌlt; ə'dʌlt] [frɒm; frəm] ['læŋkəstə(r)]
a juvenile from Webster County and an adult from Lancaster
一个 少年 从 韦伯斯特 县 和 一个 成人 从 兰开斯特
['kaʊnti] , [ɑː(r); ə(r)] [bəʊθ] ['tɪpɪk(ə)l] [ˌpærə'dɑːksəs] .
County , are both typical paradoxus .
县 , 是 两个都 典型的 悖论 .

一名来自韦伯斯特县的青少年和一名来自兰开斯特县的成年人，都是典型的悖论案例。

" [ai] [hæv; həv] [ɪg'zæmɪnd] [ðə; ði] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] ['webstə(r)] ['kaʊnti] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] [baɪ] [glɑːs]
" I have examined the specimen from Webster County referred to by Glass
" 我 有 检查 这 标本 从 韦伯斯特 县 指 到 经过 玻璃
[ænd; ənd] [ə'griː] [ðæt] [ˌaɪ 'tiː] [ɪz] [ˌpærə'dɑːksəs] .
and agree that it is paradoxus .
和 同意 那 它 是 悖论 .

"我检查了格拉斯提到的韦伯斯特县的标本，并同意它是悖论。

[ai] [hæv; həv] [nɒt] [siːn] [ðə; ði] ['spesɪmən] [frɒm; frəm]
I have not seen the specimen from
我 有 不是 已见 这 标本 从

我还没有见过标本。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 485]
[页 -]

[第485页]

[naɪn][miː] . [ˌɛn'dʌbəljuː][ɒv; əv] ['lɪŋkən]
9 mi . NW of Lincoln
9 米 . 西北 的 林肯

林肯西北9英里

; [haʊ'evə(r)] , [ə'nʌðə(r)] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] [ðeə(r)] , [tuː] ['ʌðə(r)z] [frɒm; frəm] ['læŋkəstə(r)] ['kaʊnti] ,
; however , another specimen from there , two others from Lancaster County ,
; 然而 , 其他 标本 从 那里 , 二 其他的 从 兰开斯特 县 ,

然而，那里还发现了另一个标本，兰开斯特县还发现了另外两个标本。

[ænd; ənd] [wʌn] [frɒm; frəm] ['suːərd] ['kaʊnti] ([siː] [ə'bʌv]) , [ɑː(r); ə(r)] [hɪə(r)] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] [piː] . [eɪtʃ] .
and one from Seward County (see above) , are here referred to P . h .
和 一 从 西沃德 县 (看 多于) , 是 这里 指 到 P . h .
- ,
spilotus ,
- ,

其中一株来自苏厄德县（见上文），这里将其归类为 P. h. spilotus。

['rɑːðə(r)] [ðæn; ðən] [piː] . [eɪtʃ] . [ˌpærə'dɑːksəs] ,
rather than P . h . paradoxus ,
相当 比 P . h . 悖论 ,

而不是 P. h. paradoxus，

[ɒn] [ðə; ði] ['beɪsɪs] [ɒv; əv] ['nəʊtəbli] [dɑːkə] ['dɔːs(ə)l] [ˌkʌlə'reɪʃ(ə)n] [ænd; ənd] [smɔːlə(r)] [ɪk'stɜːn(ə)l] [ænd; ənd]
on the basis of notably darker dorsal coloration and smaller external and
在 这 基础 的 尤其 较暗 背侧 着色 和 较小的 外部的 和
['kreɪniəl] ['meʒəm(ə)nts] .
cranial measurements .
颅骨 测量 .

根据明显较深的背部颜色和较小的外部及颅部尺寸判断。

[ðə; ði] [reɪndʒ] [ɒv; əv] [piː] . [eɪtʃ] . - [ɪn] [nə'bræskə] , [æz; əz] ['prez(ə)ntli] [nəʊn] , ['ðeəfɔː(r)] , [ɪz]
The range of P . h . spilotus in Nebraska , as presently known , therefore , is
这 范围 的 P . h . - 在 内布拉斯加州 , 作为 目前 已知 , 所以 , 是
['lɪmɪtɪd] [tuː; tə] [ðə; ði] ['iːstən] ,
limited to the eastern ,
有限的 到 这 东 ,

因此，目前已知的 P. h. spilotus 在内布拉斯加州的分布范围仅限于东部地区。

[mɔː(r)] ['hjuːmɪd] [pɑːt] [ɒv; əv] [ðə; ði] [steɪt] , [saʊθ] [ɒv; əv] [ðə; ði] [plæt] ['rɪvə(r)] .
more humid part of the State , south of the Platte River .
更多的 湿 部分 的 这 状态 , 南 的 这 普拉特 河 .

该州较为潮湿的地区，位于普拉特河以南。

[ˌpɛroʊ'maɪskəs] [ˌmænɪkjuː'leɪtəs] - [mɜːrnz] .
Peromyscus maniculatus osgoodi Mearns .
鹿鼠 曼氏 - 米恩斯 .

Peromyscus maniculatus osgoodi Mearns.

[dɪə(r)] [maʊs] . — - (- : -) [rɪ'pɔːtɪd] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] , ['ʌndə(r)] [ðə; ði] [neɪm]
Deer Mouse . — Swenk (1908 : 95) reported this subspecies , under the name
鹿 老鼠 . — - (- : -) 据报道 这 亚种 , 在下面 这 姓名
[ˌpɛroʊ'maɪskəs] - , [frɒm; frəm] [glen] ,
Peromyscus nebrascensis , from Glen ,
鹿鼠 - , 从 格伦 ,

鹿鼠。——斯温克（1908：95）报道了该亚种，并将其命名为内布拉斯加州鹿鼠（Peromyscus nebrascensis），发现于格伦。

[ænd; ənd] [daɪs] (- : -) [rɪ'pɔːtɪd] [ðə; ði] ['sʌbspiːʃiːz] [frɒm; frəm] ['ægət] ,
and Dice (1941 : 17) reported the subspecies from Agate ,
和 骰子 (- : -) 据报道 这 亚种 从 玛瑙 ,

Dice（1941：17）报道了来自阿加特的亚种，

[bəuθ] [ləu'kælitiz] ['biːɪŋ] [ɪn] [suː] ['kaʊnti] [ɪn] [ðə; ði] ['nɔːθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [ðə; ði] [steɪt] .

both localities being in Sioux County in the northwestern part of the State .

两个都 地方 存在 在 苏族 县 在 这 西北 部分 的 这 状态 .

这两个地方都位于该州西北部的苏县。

['ɒsˌgʊd] (-) , [haʊ'evə(r)] ,

Osgood (1909) , however ,

奥斯古德 (-) , 然而 ,

然而，奥斯古德（1909 年）

[dɪd] [nɒt] ['menʃ(ə)n] [nɪ'bræskən] ['spesəmən] [ɒv; əv] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ænd; ənd] [ɪk'skluːdɪd] [ˌaɪ 'tiː] [frɒm; frəm]

did not mention Nebraskan specimens of this subspecies and excluded it from

做过 不是 提到 内布拉斯加州 标本 的 这 亚种 和 排除 它 从

[ðə; ði] [steɪt] [ɒn] [hɪz; ɪz] ([ɒp] . [sɪt] .) [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [mæp] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['sʌbspiːʃiːz] [ɒv; əv] [piː] .

the State on his (op . cit .) distribution map of the subspecies of P .

这 状态 在 他的 (操作 . 引用 .) 分配 地图 的 这 亚种 的 P .

[ˌmænɪkjuː'leɪtəs] .

maniculatus .

曼氏 .

在他的（同上）P. maniculatus 亚种分布图上，他没有提及内布拉斯加州的该亚种标本，也没有将该亚种排除在该州之外。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] , [kiː] (- : -) [rɪ'pɔːts] , [æz; əz] [piː] . [em] . - ,

In addition , Quay (1948 : 181) reports , as P . m . nebrascensis ,

在 添加 , 码头 (- : -) 报告 , 作为 P . 米 . - ,

此外，Quay（1948：181）报告称，P. m. nebrascensis，

[dɪə(r)] [maɪs] [əb'teɪnd] [baɪ] [hɪm] [ɪn] [ðə; ði] ['bædlændz] [ɒv; əv] ['nɔːðən] [suː] ['kaʊnti] [ænd; ənd]

deer mice obtained by him in the badlands of northern Sioux County and

鹿 小鼠 获得 经过 他 在 这 恶地 的 北方 苏族 县 和

[ə'dʒeɪs(ə)nt] [ˌnaɪə'brɑːrə] ['kaʊnti] , [waɪ'əʊmɪŋ] .

adjacent Niobrara County , Wyoming .

邻近的 尼奥布拉拉 县 , 怀俄明州 .

他在怀俄明州苏县北部和邻近的尼奥布拉拉县的荒地中捕获了鹿鼠。

[fɔː(r)] [dɪə(r)] [maɪs] [rɪ'fɜːrəbl; 'refrəbl] [tuː; tə] [piː] . [em] . - [hæv; həv] [biːn] [əb'teɪnd] [frɒm; frəm]

Four deer mice referable to P . m . osgoodi have been obtained from

四 鹿 小鼠 可参考的 到 P . 米 . - 有 到过 获得 从

['sevrəl] [ləu'kælitiz] [ɒn] [ðə; ði] [paɪn] [rɪdʒ] [ɪn] [dɔːz] ['kaʊnti] [æz; əz] ['fɒləʊz] :

several localities on the Pine Ridge in Dawes County as follows :

一些 地方 在 这 松树 岭 在 道斯 县 作为 跟随 :

从道斯县松岭的几个地点获得了四只可归类为 P. m. osgoodi 的鹿鼠，具体如下：

[θriː] [miː] . [iː] [ɒv; əv] ['tʃædrən] , [ˌtuː'tuː] ; ['tʃædrən] [steɪt] [pɑːk] , [wʌn] ; [θriː] [miː] . [es 'dʌbljuː] [ɒv; əv]

3 mi . E of Chadron , 2 ; Chadron State Park , 1 ; 3 mi . SW of

3 米 . E 的 查德伦 , 2 ; 查德伦 状态 公园 , 1 ; 3 米 . 西南 的

['krɔːfəd] , [wʌn] .

Crawford , 1 .

克劳福德 , 1 .

3 英里。 Chadron 的 E，2；查德伦州立公园，1； 3 英里。克劳福德西南，1。

[wen] [kəm'peəd] [wɪð] ['spesəmən] [ɒv; əv] [piː] . [em] . - , [ˌdʒiːə'græfɪkli] [ə'dʒeɪs(ə)nt]

When compared with specimens of P . m . nebrascensis , geographically adjacent

什么时候 比较的 和 标本 的 P . 米 . - , 地理上 邻近的

[tuː; tə] [ðə; ði] [iːst] ,

to the east ,

到 这 东方 ,

与地理位置在其东部相邻的内布拉斯加州 P. m. nebrascensis 标本相比，

[ðiːz] [maɪs][ɑː(r); ə(r)] [siːn] [tuː; tə][biː; bi]['nəʊtəbli] [dɑːkə] [ænd; ənd] [les] ['bʌfi] [ðæn; ðən]
these mice are seen to be notably darker and less buffy than
这些 小鼠 是 已见 到 是 尤其 较暗 和 较少的吸血鬼猎人巴菲 比

\- [ænd; ənd][tuː; tə] ['ævərɪdʒ] [sɪɡ'nɪfɪkəntli] ['lɑːdʒə(r)][ɪn][bəʊθ][ɪk'stɜːn(ə)l][ænd; ənd]['kreɪniəl]
nebrascensis and to average significantly larger in both external and cranial
\- 和 到 平均的 显著地 更大的 在 两个都 外部的 和 颅骨

['meʒəm(ə)nts] .
measurements .
测量 .

这些小鼠的毛色明显比内布拉斯加鼠深，黄色较少，而且体型（包括外部尺寸和颅骨尺寸）也明显更大。

[ɔːl] [dɪə(r)] [maɪs] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [paɪn] [rɪdʒ] [ænd; ənd] [ə'dʒeɪs(ə)nt] ['bædlændz] [ɒv; əv] [ɪk'striːm]
All deer mice from the Pine Ridge and adjacent badlands of extreme
全部 鹿 小鼠 从 这 松树 岭 和 邻近的 恶地 的 极端

['nɔːθ'westən] [nə'bræskə] ['prɒbəbli] [ɑː(r); ə(r)] [best] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] [piː] . [em] . - .
northwestern Nebraska probably are best referred to P . m . osgoodi .
西北 内布拉斯加州 大概 是 最好的 指 到 P . 米 . - .

来自内布拉斯加州西北部松岭及其附近荒地的所有鹿鼠，可能最好归为 P. m. osgoodi。

[ɪk'stɜːn(ə)l] ['meʒəm(ə)nts] [ɒv; əv] [tuː] ['ædʌlt; ə'dʌlt] ['fiːmeɪl] [ɑː(r); ə(r)] [rɪ'spektɪvli] : ['təʊt(ə)l] [leŋkθ; leŋθ]
External measurements of two adult females are respectively : Total length
外部的 测量 的 二 成人 女性 是 分别 : 全部的 长度

, - , - ; [leŋkθ; leŋθ] [ɒv; əv] [teɪl] - ['vɜːtɪbrə; 'vɜːtɪbreɪ] ,
, 180 , 175 ; length of tail - vertebrae ,
, - , - ; 长度 的 尾巴 - 椎骨 ,

两只成年雌性的外部测量数据分别为：全长，180，175；尾椎长度，

\- , - ; [leŋkθ; leŋθ] [ɒv; əv] [haɪnd] [fʊt] , - , - ; [leŋkθ; leŋθ] [ɒv; əv] [ɪə(r)] , - , - .
78 , 74 ; length of hind foot , 19 , 20 ; length of ear , 17 , 16 .
\- , - ; 长度 的 后 脚 , - , - ; 长度 的 耳朵 , - , - .

78、74；后足长度，19、20；耳朵长度，17、16。

[ˌniːˈɑːtoʊmə] [ˌflɔːrɪˈdænə] [kæm'pestris] [dʒeɪ] . [ə; eɪ] . ['ælən] .
Neotoma floridana campestris J . A . Allen .
新瘤 佛罗里达 野油菜 J . 一个 . 艾伦 .

佛罗里达新番茄 JA Allen。

['flɒrɪdə] [wʊd] [ræt] . — [faɪv] [wʊd] [ræts] [frɒm; frəm] [faɪv] [miː] . [en] , [ˌtuːˈtuː] [miː] . ['dʌbljuː] [ɒv; əv] [p'ɑːks] ,
Florida Wood Rat . — Five wood rats from 5 mi . N , 2 mi . W of Parks ,
佛罗里达 木头 鼠 . — 五 木头 老鼠 从 5 米 . N , 2 米 . W 的 公园 ,

佛罗里达木鼠——在帕克斯以北 5 英里、以西 2 英里处发现了五只木鼠。

['dʌndi] ['kaʊnti] , [ɪn] [ɪk'striːm] [ˌsaʊθ'westən] [nə'bræskə] , [prə'vaɪd] [ðə; ði] [fɜːst] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] [ɒv; əv]
Dundy County , in extreme southwestern Nebraska , provide the first record of
邓迪 县 , 在 极端 西南 内布拉斯加州 , 提供 这 第一的 记录 的

[ə'kʌrəns] [ɒv; əv] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ɪn] [nə'bræskə] .
occurrence of this subspecies in Nebraska .
发生 的 这 亚种 在 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州西南部的邓迪县首次记录到该亚种在内布拉斯加州的出现。

[ðiːz] ['ænɪmlz] [wɜː(r); wə(r)] [træpt] [ɪn] ['aʊtlaɪɪŋ] [ʃedz] [æt; ət] [ðə; ði] [rɒk] [kriːk] [steɪt] [fɪʃ]
These animals were trapped in outlying sheds at the Rock Creek State Fish
这些 动物 是 被困 在 边远 棚屋 在 这 岩石 溪 状态 鱼

['hætʃəri] .
Hatchery .
孵化场 .

这些动物被困在罗克溪州立鱼类孵化场的外围棚子里。

[tuː] [lɑːdʒ] [wʊd] - [ræt] ['haʊzɪz] [wɜː(r); wə(r)][ɪn][ə; eɪ] [dens] ['θɪkɪt] [ɒv; əv] [brʌʃ] [ænd; ənd] [jʌŋ]
Two large wood - rat houses were in a dense thicket of brush and young
二 大的 木头 - 鼠 房屋 是 在 一个 稠密 灌木丛 的 刷子 和 年轻的
[triːz] [ɪn][ə; eɪ] [smɔːl] [drɔː] [ɒn][ðə; ði] [west] [saɪd] [ɒv; əv][ðə; ði] [məʊst] ['westwədli] ['hætʃəri] [leɪk] .
trees in a small draw on the west side of the most westwardly hatchery lake .
树木 在 一个 小的 画 在 这 西方 边 的 这 最多 向西 孵化场 湖 .

在最西边的孵化场湖泊西侧的一个小沟壑里，灌木丛和幼树丛中，有两个大型木鼠屋。

[braʊn] [ræts] (['rætəs] [nɔːr'vɛdʒɪkəs]) [ɪn'hæbɪtɪd] [ə; eɪ] [ˌkɒmbɪ'neɪʃ(ə)n] ['gærɑːʒ] - ['stɔːrɪdʒ] [bɑːn] [æt; ət]
Brown rats (Rattus norvegicus) inhabited a combination garage - storage barn at
棕色的 老鼠 (鼠 挪威) 有人居住的 一个 组合 车库 - 贮存 谷仓 在
[ðə; ði] ['hætʃəri] [ænd; ənd] [nəʊ] [wʊd] [ræts] [wɜː(r); wə(r)] ['teɪkən] [ðeə(r)] .
the hatchery and no wood rats were taken there .
这 孵化场 和 不 木头 老鼠 是 已采取 那里 .

孵化场的车库兼储藏棚里住着褐家鼠（Rattus norvegicus），没有把林鼠带到那里。

[maɪk'rəʊtəs] [ˌpɛnsəl'vænɪkəs] [ˌpɛnsəl'vænɪkəs] ([ɔːrd]) .
Microtus pennsylvanicus pennsylvanicus (Ord) .
田鼠 宾夕法尼亚 宾夕法尼亚 (奥德) .

Microtus pennsylvanicus pennsylvanicus (Ord).

[ˌpensl'veɪniə] ['medəʊ] [maʊs] . — [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ə'kɜːz] [ɪn] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sentrəl]
Pennsylvania Meadow Mouse . — This subspecies occurs in eastern and central
宾夕法尼亚州 草地 老鼠 . — 这 亚种 发生 在 东 和 中央

宾夕法尼亚草地鼠——该亚种分布于东部和中部地区。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 486]
[页 -]

[第486页]

[nə'bræskə] ([siː] ['beɪli] , - : - [ænd; ənd] - , - : -) .
Nebraska (see Bailey , 1900 : 18 and Swenk , 1908 : 104) .
内布拉斯加州 (看 贝利 , - : - 和 - , - : -) .

内布拉斯加州（参见 Bailey，1900：18 和 Swenk，1908：104）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] [ɑː(r); ə(r)][æz; əz] [f'ɒləʊz] : [faɪv][miː] . [iː][ɒv; əv] ['raɪzɪŋ] ['sɪti] ,
Additional records of occurrence are as follows : 5 mi . E of Rising City ,
额外的 记录 的 发生 是 作为 跟随 : 5 米 . E 的 崛起 城市 ,

其他发生记录如下：位于 Rising City 以东 5 英里处。

['bʌtlə(r)] ['kaʊnti] , [faɪv] ; [fɔːr][miː] . [ˌes'iː][ɒv; əv]['lɔrəl, 'lɔ:-] , ['siːdə(r)] ['kaʊnti] , [wʌn] ; [weɪn] , [ˌtuː'tuː] ,
Butler County , 5 ; 4 mi . SE of Laurel , Cedar County , 1 ; Wayne , 2 ,
巴特勒 县 , 5 ; 4 米 . 东南 的 劳雷尔 , 雪松 县 , 1 ; 韦恩 , 2 ,

巴特勒县，5；位于劳雷尔东南4英里处，锡达县，1；韦恩，2，

[ænd; ənd][ˌtuː'tuː] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [iː][ɒv; əv] [weɪn] , [wʌn] , [weɪn] ['kaʊnti] ; [ˌtuː'tuː] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː]
and 2 - 1 / 2 mi . E of Wayne , 1 , Wayne County ; 2 - 1 / 2
和 2 - 1 / 2 米 . E 的 韦恩 , 1 , 韦恩 县 ; 2 - 1 / 2
[miː] . [en][ɒv; əv][ɔːrd] , ['væli] ['kaʊnti] , [fɔːr] .
mi . N of Ord , Valley County , 4 .
米 . N 的 奥德 , 谷 县 , 4 .

位于韦恩县韦恩以东 2.5 英里处，1 英里；位于瓦利县奥德以北 2.5 英里处，4 英里。

- ['kuːpəri] - ([kuːz]) .
Synaptomys cooperi gossii (Coues) .
- 库珀里 - (库斯) .

Synaptomys cooperi gossii (Coues)。

['kuːpə(r)] ['lemɪŋ] [maʊs] . — ['fɪktər] [ænd; ənd]['hænsən] (- : [wʌn] - [eit]) [rɪ'pɔːtɪd] [ðə; ði][fɜːst]
Cooper Lemming Mouse . — Fichter and Hanson (1947 : 1 - 8) reported the first
库珀 旅鼠 老鼠 . — 菲希特 和 汉森 (- : 1 - 8) 据报道 这 第一的
[nəʊn] [ə'kʌrəns] [ɒv; əv] [ðɪs] ['maɪkrəˌtaɪn][ɪn] [nə'bræskə] ,
known occurrence of this microtine in Nebraska ,
已知 发生 的 这 微针 在 内布拉斯加州 ,

库珀旅鼠——Fichter 和 Hanson (1947: 1-8) 报道了内布拉斯加州首次发现这种田鼠，

[rɪ'kɔːdɪŋ] ['spesəmən] [frɒm; frəm] ['sevrəl] [ləu'kælitiz][ɪn]['læŋkəstə(r)] ['kaʊnti] [ænd; ənd][wʌn][frɒm; frəm]
recording specimens from several localities in Lancaster County and one from
记录 标本 从 一些 地方 在 兰开斯特 县 和 一 从
[nɪə(r)]['væləntaɪn] , ['tʃeri] ['kaʊnti] .
near Valentine , Cherry County .
靠近 情人节 , 樱桃 县 .

记录了来自兰开斯特县几个地点的标本，以及来自樱桃县瓦伦丁附近的一个标本。

['riːs(ə)nt] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ðɪs] [maʊs] [wɪtʃ] [help] [tuː; tə]['klærəfaɪ][ɪts] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə]
Recent records of this mouse which help to clarify its distribution in Nebraska
最近的 记录 的 这 老鼠 哪个 帮助 到 阐明 它是 分配 在 内布拉斯加州
[ɑː(r); ə(r)][æz; əz] ['fɒləʊz] :
are as follows :
是 作为 跟随 :

以下是近期有关这种老鼠的记录，有助于明确其在内布拉斯加州的分布情况：

[fɔːr][miː] . [en] , [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [iː][ɒv; əv][ɒk'teɪvɪə] , ['bʌtlə(r)] ['kaʊnti] , [wʌn] ; [faɪv][miː] . [en] ,
4 mi . N , 1 / 2 mi . E of Octavia , Butler County , 1 ; 5 mi . N ,
4 米 . N , 1 / 2 米 . E 的 奥克塔维娅 , 巴特勒 县 , 1 ; 5 米 . N ,

巴特勒县奥克塔维亚以北 4 英里，以东 0.5 英里；以北 5 英里，

[ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː][ɒv; əv][p'ɑːks] , ['dʌndi] ['kaʊnti] , [wʌn] ; [wʌn][miː] . [en][ɒv; əv] ['plez(ə)nt] [deɪl] ,
2 mi . W of Parks , Dundy County , 1 ; 1 mi . N of Pleasant Dale ,
2 米 . W 的 公园 , 邓迪 县 , 1 ; 1 米 . N 的 令人愉快的 戴尔 ,
['suːərd] ['kaʊnti] , [wʌn] .
Seward County , 1 .
西沃德 县 , 1 .

位于邓迪县帕克斯以西 2 英里处，1 英里；位于苏厄德县普莱森特戴尔以北 1 英里处，1 英里。

[æn; ən]['ædʌlt; ə'dʌlt] ['fiːmeɪl] [frɒm; frəm] ['dʌndi] ['kaʊnti] [prə'vaɪdz] [ðə; ði] ['westənməʊst] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd]
An adult female from Dundy County provides the westernmost record
一个 成人 女性 从 邓迪 县 提供 这 最西端 记录
[ɒv; əv] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] ['spiːʃiːz] [ɪn] [nɔːθ] [ə'merɪkə] .
of distribution of the species in North America .
的 分配 的 这 物种 在 北 美国 .

来自邓迪县的一只成年雌性个体提供了该物种在北美分布的最西端记录。

[ðə; ði]['ænɪm(ə)l][wɒz; wəz] [træpt] [ɒn][nəʊ'vembə(r)][wʌn] , - ,
The animal was trapped on November 1 , 1952 ,
这 动物 曾是 被困 在 十一月 1 , - ,

这只动物于1952年11月1日被捕获。

[ɪn][əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] [wɪð] [maɪk'rəʊtəs] [ˌpɛnsəl'vænɪkəs] [moʊ'dɛstəs][ɪn][ə; eɪ] ['mɑːʃi] ['eəriə][æt; ət]
in association with Microtus pennsylvanicus modestus in a marshy area at
在 协会 和 田鼠 宾夕法尼亚 莫德斯图斯 在 一个 沼泽地 区域 在
[ðə; ði] [rɒk] [kriːk] [steɪt] [fɪʃ] ['hætʃəri] [ɒn] [sprɪŋ] - [fed] [rɒk] [kriːk] .
the Rock Creek State Fish Hatchery on spring - fed Rock Creek .
这 岩石 溪 状态 鱼 孵化场 在 春天 - 美联储 岩石 溪 .

与 Microtus pennsylvanicus modestus 一起生活在 Rock Creek State Fish Hatchery 的 Rock Creek 泉水溪流的沼泽地区。

[ðə; ði] ['pelɪdʒ] [ɒn][ðə; ði] [bæk] [ɪz]['nəʊtəbli] [dɑːkə] [ðæn; ðən][ɪn][es] . [siː] . - ,
The pelage on the back is notably darker than in S . c . gossii ,
这 毛皮 在 这 后退 是 尤其 较暗 比 在 S . c . - ,

背部的毛皮颜色明显比 S. c. gossii 深，

[ænd; ənd][rɪ'zemb(ə)lz][es] . [siː] . [pæljədɪs][frɒm; frəm][ðə; ði]['simə,rəun]['rɪvə(r)] ['dreɪnɪdʒ] [ɪn] [miːd]
and resembles S . c . paludis from the Cimarron River drainage in Meade
和 类似 S . c . 帕鲁迪斯 从 这 锡马龙 河 引流 在 米德
['kaʊnti] , ['kænzəs] ,
County , Kansas ,
县 , 堪萨斯州 ,

并且与堪萨斯州米德县锡马龙河流域的沼泽拟深海金龟（S. c. paludis）相似。

[bʌt; bət][ɪn][ðə; ði] [sʌm] ['təʊt(ə)l][ɒv; əv][ɪts] ['kærəktəz] [ˌaɪ 'tiː][məʊst] ['kləʊsli] [rɪ'zemb(ə)lz][es] . [siː] . -
but in the sum total of its characters it most closely resembles S . c . gossii
但 在 这 和 全部的 的 它是 人物 它 最多 密切 类似 S . c . -
[ə'mʌŋ] [nemd] ['sʌbspiːʃiːz] .
among named subspecies .
之中 命名 亚种 .

但就其所有特征而言，在已命名的亚种中，它与 S. c. gossii 最为相似。

[mə'stiːlə] - [kæm'pestris]['dʒæksən] .
Mustela rixosa campestris Jackson .
妙思乐 - 野油菜 杰克逊 .

黄鼬 (Mustela Rixosa Campestris Jackson)。

[liːst] ['wiːzl] . — [ðə; ði] [liːst] ['wiːzl] [ə'kɜːz] [ɪn] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sentrəl] [nə'bræskə] ([siː] -
Least Weasel . — The least weasel occurs in eastern and central Nebraska (see Swenk
至少 黄鼠狼 . — 这 至少 黄鼠狼 发生 在 东 和 中央 内布拉斯加州 (看 -
, - : - - - [ænd; ənd] [hɔːl] , - :
, 1926 : 313 - 330 and Hall , 1951 :
, - : - - - 和 大厅 , - :

伶鼬——伶鼬分布于内布拉斯加州东部和中部（参见 Swenk，1926：313-330 和 Hall，1951：)。

-) [bʌt; bət][ɪz] [nəʊn] [baɪ]['əʊnli][ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] [iːtʃ] [ləʊ'kæləti][ɒv; əv]
192) but is known by only a single specimen from each locality of
-) 但 是 已知 经过 仅有的 一个 单身的 标本 从 每个 地点 的
['rekɔːd; rɪ'kɔːd] [seɪv] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði]['eəriə] [ə'raʊnd] ['ɪnlənd; ɪn'lænd] ,
record save for the area around Inland ,
记录 节省 为了 这 区域 大约 内陆 ,

192）但除内陆地区以外，每个有记录的地点都只有一份标本。

[kleɪ] ['kaʊnti] (- , [ɒp] . [sɪt] .) .
Clay County (Swenk , op . cit .) .
黏土 县 (- , 操作 . 引用 .) .

克莱县（Swenk，同上）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɒv; əv] [ðɪs] ['mʌstɪlɪd] [ɪn] [nə'bræskə] [ɑː(r); ə(r)] : ['heɪstɪŋz]
Additional records of the distribution of this mustelid in Nebraska are : Hastings
额外的 记录 的 这 分配 的 这 鼬科 在 内布拉斯加州 是 : 黑斯廷斯
, ['ædəmz] ['kaʊnti] ,
, Adams County ,
, 亚当斯 县 ,

关于这种鼬科动物在内布拉斯加州分布的其他记录有：黑斯廷斯、亚当斯县，

[wʌn] ([ˌeɪtʃ 'em]) ; ['skaɪlər] , ['koʊlfæks] ['kaʊnti] , [wʌn] (-) ;
1 (HM) ; Schuyler , Colfax County , 1 (NGFPC) ;
1 (HM) ; 斯凯勒 , 科尔法克斯 县 , 1 (-) ;

1 (HM)；斯凯勒，科尔法克斯县，1 (NGFPC)；

['goʊnər] , ['suːərd] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛn'ɛs'ɛm]) ; - [miː] . [es][ɒv; əv][ɔːrd] , ['væli] ['kaʊnti] , [wʌn] (
Goehner , Seward County , 1 (NSM) ; 10 mi . S of Ord , Valley County , 1 (
戈纳 , 西沃德 县 , 1 (国家安全机制) ; - 米 . S 的 奥德 , 谷 县 , 1 (
-) .
NGFPC) .
-) .

戈纳，苏厄德县，1（NSM）；奥德以南 10 英里，瓦利县，1（NGFPC）。

[ðə; ði][lɑːst] ['menʃ(ə)nd] ['spesɪmən] , [ə; eɪ] [skʌl] ['əʊnli] , [wɒz; wəz] [əb'teɪnd] [frɒm; frəm][ə; eɪ] ['pelɪt]
The last mentioned specimen , a skull only , was obtained from a pellet
这 最后的 提及 标本 , 一个 颅骨 仅有的 , 曾是 获得 从 一个 颗粒
[ɒv; əv][æn; ən][ˌʌnaɪ'dentɪfaɪd][ræp'tɔːrɪəl][bɜːd] .
of an unidentified raptorial bird .
的 一个 身份不明 猛禽 鸟 .

最后提到的标本，只有一个头骨，是从一只身份不明的猛禽的食丸中获得的。

['lɪtrətʃə(r); 'lɪtərətʃə] ['saɪtɪd]
LITERATURE CITED
文学 引用

参考文献

['beɪli] , [viː] . - .
Bailey , V . 1900 .
贝利 , V . - .

Bailey，V.1900。

[rɪ'vɪʒ(ə)n] [ɒv; əv] [ə'merɪkən] [vəʊlz] [ɒv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs][maɪk'rəʊtəs] .
Revision of American voles of the genus Microtus .
修订 的 美国人 田鼠 的 这 属 田鼠 .

美洲田鼠属（Microtus）的修订。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , [dʒuːn][sɪks] .
Fauna , 17 : 1 - 88 , June 6 .
动物群 , - : 1 - - , 六月 6 .

动物志，17：1-88，6月6日。

[bɛəd] , [es] . [ef] . - .
Baird , S . F . 1858 .
贝尔德 , S . F . - .

Baird，SF1858。

[ekspləˈreɪʃnz] [ænd; ənd] [sər've] [fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ] ['reɪlrəʊd] [ruːt] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ˌmɪsɪ'sɪpi] ['rɪvə(r)]
Explorations and surveys for a railroad route from the Mississippi River
探索 和 调查 为了 一个 铁路 路线 从 这 密西西比州 河
[tuː; tə][ðə; ði][pə'sɪfɪk]['əʊʃ(ə)n] .
to the Pacific Ocean .
到 这 太平洋 海洋 .

从密西西比河到太平洋的铁路路线勘探和勘测。

[wɔː(r)] [dɪ'pɑːtmənt] .
War Department .
战争 部门 .

战争部。

[eɪt] (['mæm(ə)lz] , [pɑːt] [wʌn]) : [ˌɛks'ɛks'tuː] + - , [dʒʊ'laɪ] - .
8 (Mammals , Part 1) : xxxii + 757 , July 14 .
8 (哺乳动物 , 部分 1) : xxxii + - , 七月 - .

8（哺乳动物，第 1 部分）：xxxii + 757，7 月 14 日。

[biːd] , ['dʌbljuː] . [iː] . - .
Beed , W . E . 1936 .
比德 , W . E . - .

比德，WE1936。

[ə; eɪ] [prɪ'lɪmɪnəri] ['stʌdi] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['ænɪm(ə)l] [i'kɒlədʒi] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [prɪ'zɜːv] .
A preliminary study of the animal ecology of the Niobrara Game Preserve .
一个 初步的 学习 的 这 动物 生态 的 这 尼奥布拉拉 游戏 保存 .

尼奥布拉拉野生动物保护区动物生态学初步研究。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

[kən'sɜːv] .
Conserv .
保护 .

保护。

[dept] . , [kən'sɜːv] .
Dept . , Conserv .
部门 . , 保护 .

保护部

[sɜːrv] .
Surv .
生存 .

调查。

[dɪv] . , ['juːnɪv] .
Div . , Univ .
div . , 大学 .

大学

[nə'bræskə] , - : [wʌn] - - , [ɒk'təʊbə(r)] .
Nebraska , 10 : 1 - 33 , October .
内布拉斯加州 , - : 1 - - , 十月 .

内布拉斯加州，10：1-33，10 月。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 487]
[页 -]

[第 487 页]

['kɒkrəm] , [iː] . [el] . - .
Cockrum , E . L . 1951 .
考克伦 , E . L . - .

Cockrum，EL1951。

[ə; eɪ] [njuː] ['pɒkɪt] [maʊs] (['dʒiːnəs] [ˌpɛroʊ'nɑːθəs]) [frɒm; frəm] ['kænzəs] .
A new pocket mouse (genus Perognathus) from Kansas .
一个 新的 口袋 老鼠 (属 佩罗格纳图斯) 从 堪萨斯州 .

堪萨斯州发现一种新的口袋鼠（Perognathus属）。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

['kænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , Mus .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [faɪv] : - - - , [dɪ'sembə(r)] - .
Hist . , 5 : 203 - 206 , December 15 .
历史 . , 5 : - - - , 十二月 - .

历史，5：203-206，12月15日。

[daɪs] , [el] . [ɑː(r)] . - .
Dice , L . R . 1941 .
骰子 , L . 拉 . - .

骰子，LR1941。

[ˌveəri'eɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði][dɪə(r)][maɪs] ([ˌpɛroʊ'maɪskəs][ˌmænɪkjuː'leɪtəs]) [ɒn][ðə; ði][sænd] [hɪlz] [ɒv; əv]
Variation of the deer mice (Peromyscus maniculatus) on the sand hills of
变化 的 这 鹿 小鼠 (鹿鼠 曼氏) 在 这 沙 丘陵 的
[nə'bræskə] [ænd; ənd][ə'dʒeɪs(ə)nt]['eəriəz] .
Nebraska and adjacent areas .
内布拉斯加州 和 邻近的 区域 .

内布拉斯加州沙丘及邻近地区鹿鼠（Peromyscus maniculatus）的变种。

[kən'trɪb] .
Contrib .
贡献 .

贡献。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

['mɪʃɪgən] [læb] .
Michigan Lab .
密歇根州 实验室 .

密歇根实验室。

[vɜːt] .
Vert .
垂直 .

垂直。

[dʒə'netɪks] , - : [wʌn] - - , [dʒʊ'laɪ] .
Genetics , 15 : 1 - 19 , July .
遗传学 , - : 1 - - , 七月 .

遗传学，15：1-19，7月。

['fɪktər] , [iː] . [eɪtʃ] . , [ænd; ənd][em] . [ef] . ['hænsən] . - .
Fichter , E . H . , and M . F . Hanson . 1947 .
菲希特 , E . H . , 和 M . F . 汉森 . - .

Fichter, EH 和 MF Hanson.1947。

[ðə; ði] [gɒs] ['lemɪŋ] [maʊs] , - ['kuːpəri] - ([kuːz]) , [ɪn] [nə'bræskə] .
The Goss lemming mouse , Synaptomys cooperi gossii (Coues) , in Nebraska .
这 戈斯 旅鼠 老鼠 , - 库珀里 - (库斯) , 在 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的戈斯旅鼠，学名 Synaptomys cooperi gossii (Coues)。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

[nə'bræskə] [steɪt] [mʌs] . , [θriː] : [wʌn] - [eit] , [sep'tembə(r)] .
Nebraska State Mus . , 3 : 1 - 8 , September .
内布拉斯加州 状态 音乐 . , 3 : 1 - 8 , 九月 .

内布拉斯加州立博物馆，3：1-8，9 月。

[glɑːs] , [biː] . [piː] . - .
Glass , B . P . 1947 .
玻璃 , B . P . - .

玻璃，BP1947。

[ˌdʒiːə'græfɪk] [ˌveəri'eɪʃ(ə)n][ɪn] [ˌpɛroʊ'nɑːθəs] ['hɪspɪdəs] .
Geographic variation in Perognathus hispidus .
地理 变化 在 佩罗格纳图斯 粗毛 .

Perognathus hispidus 的地理变异。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - - - , [dʒuːn][wʌn] .
Jour . Mamm . , 28 : 174 - 179 , June 1 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 六月 1 .

日记。妈妈，28：174-179，6 月 1 日。

[hɔːl] , [iː] . [ɑː(r)] . - .
Hall , E . R . 1951 .
大厅 , E . 拉 . - .

Hall，ER1951。

[ə'merɪkən] ['wiːzəl] .
American weasels .
美国人 黄鼠狼 .

美洲鼬。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

['kænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , Mus .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [fɔːr] : [wʌn] - - , [dɪ'sembə(r)] - .
Hist . , 4 : 1 - 466 , December 27 .
历史 . , 4 : 1 - - , 十二月 - .

历史，4：1-466，12月27日。

['haʊəl] , [ə; eɪ] . [eɪtʃ] . - .
Howell , A . H . 1938 .
豪厄尔 , 一个 . H . - .

Howell，AH1938。

[rɪ'vɪʒ(ə)n] [ɒv; əv] [nɔːθ] [ə'merɪkən] [graʊnd] ['skwirəlz] [wɪð] [ə; eɪ][ˌklæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] [nɔːθ]
Revision of North American ground squirrels with a classification of the North
修订 的 北 美国人 地面 松鼠 和 一个 分类 的 这 北
[ə'merɪkən] [saɪ'jʊərɪdiː] .
American Sciuridae .
美国人 松鼠科 .

对北美地松鼠进行修订，并对北美松鼠科进行分类。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , [meɪ] - .
Fauna , 56 : 1 - 256 , May 18 .
动物群 , - : 1 - - , 可能 - .

动物志，56：1-256，5月18日。

['dʒæksən] , [eɪtʃ] . [eɪtʃ] . [tiː] . - .
Jackson , H . H . T . 1928 .
杰克逊 , H . H . T . - .

杰克逊，HHT1928。

[ə; eɪ][ˌtæksə'nɒmɪk] [rɪ'vjuː] [ɒv; əv][ðə; ði] [ə'merɪkən] [lɒŋ] - [teɪld] [ʃruː] .
A taxonomic review of the American long - tailed shrews .
一个 分类学 审查 的 这 美国人 长的 - 有尾巴的 鼩鼱 .

美洲长尾鼩的分类学研究。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : ['sɪksθ] + - , [dʒʊ'laɪ] - .
Fauna , 51 : vi + 228 , July 24 .
动物群 , - : 六 + - , 七月 - .

Fauna，51：vi + 228，7月24日。

[dʒəunz] , [dʒeɪ] . [keɪ] . [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [ænd; ənd][əʊ] . [el] . [web] . - .
Jones , J . K . Jr . , and O . L . Webb . 1949 .
琼斯 , J . K . 小 . , 和 哦 . L . 韦伯 . - .

Jones, JK Jr. 和 OL Webb.1949。

[nəʊts] [ɒn] ['mæm(ə)lz] [frɒm; frəm] ['rɪtʃədsən] ['kaʊnti] , [nə'bræskə] .
Notes on mammals from Richardson County , Nebraska .
笔记 在 哺乳动物 从 理查森 县 , 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州理查森县哺乳动物记录。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - - - , ['ɔːgəst] - .
Jour . Mamm . , 30 : 312 - 313 , August 17 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 八月 - .

日记。妈妈，30：312-313，8 月 17 日。

['ɒsˌgʊd] , ['dʌbljuː] . [eɪtʃ] . - .
Osgood , W . H . 1904 .
奥斯古德 , W . H . - .

奥斯古德，WH1904。

[tuː] [njuː] ['pɒkɪt] [maɪs][ɒv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs] [ˌpɛroʊ'nɑːθəs] .
Two new pocket mice of the genus Perognathus .
二 新的 口袋 小鼠 的 这 属 佩罗格纳图斯 .

两种新的袋鼠属（Perognathus）小鼠。

[p'rɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

['baɪəl] .
Biol .
生物学 .

生物学

[səʊʃ] .
Soc .
社会 .

社会学

['wɒʃɪŋtən] , - : - - - , [dʒuːn][naɪn] . - .
Washington , 17 : 127 - 128 , June 9 . 1909 .
华盛顿 , - : - - - , 六月 9 . - .

华盛顿，17：127-128，1909 年 6 月 9 日。

[rɪ'vɪʒ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [maɪs] [ɒv; əv][ðə; ði] [ə'merɪkən] ['dʒiːnəs][ˌpɛroʊ'maɪskəs] .
Revision of the mice of the American genus Peromyscus .
修订 的 这 小鼠 的 这 美国人 属 鹿鼠 .

美洲鹿鼠属（Peromyscus）小鼠的修订。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , ['eɪprəl] - .
Fauna , 28 : 1 - 285 , April 17 .
动物群 , - : 1 - - , 四月 - .

动物志，28：1-285，4月17日。

[kiː] , ['dʌbljuː] . [biː] . - .
Quay , W . B . 1948 .
码头 , W . B . - .

码头，WB1948。

[nəʊts] [ɒn][sʌm; səm][bæts][frɒm; frəm] [nə'bræskə] [ænd; ənd][waɪ'əʊmɪŋ] .
Notes on some bats from Nebraska and Wyoming .
笔记 在 一些 蝙蝠 从 内布拉斯加州 和 怀俄明州 .

关于内布拉斯加州和怀俄明州一些蝙蝠的记录。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - - - , [meɪ] - .
Jour . Mamm . , 29 : 181 - 182 , May 14 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 可能 - .

日记。妈妈，29：181-182，5 月 14 日。

['rɪdʒˌweɪ] , [ɑː(r)] . - .
Ridgway , R . 1912 .
里奇韦 , 拉 . - .

里奇韦，R.1912。

['kʌlə(r)] ['stændədz] [ænd; ənd]['kʌlə(r)] [nə'meŋklətʃə(r)] .
Color standards and color nomenclature .
颜色 标准 和 颜色 命名法 .

颜色标准和颜色命名法。

['wɒʃɪŋtən] , [diː] . [siː] . ['praɪvətli] ['prɪntɪd] , [ˌaɪ 'viː] + - , - [ˌpiːˌɛl'ɛs] .
Washington , D . C . Privately printed , iv + 44 , 53 pls .
华盛顿 , D . C . 私下 打印 , 四 + - , - 请 .

华盛顿特区 私人印刷，iv + 44，53 幅。

- , [em] . [eɪtʃ] . - .
Swenk , M . H . 1908 .
- , M . H . - .

斯文克，MH1908。

[ə; eɪ] [prɪ'lɪmɪnəri] [rɪ'vjuː] [ɒv; əv][ðə; ði] ['mæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nə'bræskə] .
A preliminary review of the mammals of Nebraska .
一个 初步的 审查 的 这 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州哺乳动物的初步研究。

[p'rɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

[nə'bræskə] ['eɪˌkæd] .
Nebraska Acad .
内布拉斯加州 学院 .

内布拉斯加学院

['saɪ] . , [eit] : - - - . - .
Sci . , 8 : 61 - 144 . 1926 .
科学 . , 8 : - - - . - .

科学，8：61-144.1926。

[nəʊts] [ɒn] [mʌstɛk] [kæm'pestris] ['dʒæksən] , [ænd; ənd] [ɒn] [ðə; ði] [ə'merɪkən] [fɔːmz] [ɒv; əv] [liːst] ['wiːzəl]
Notes on Mustek campestris Jackson , and on the American forms of least weasels
笔记 在 穆斯泰克 野油菜 杰克逊 , 和 在 这 美国人 表格 的 至少 黄鼠狼
.
:
.

关于野鼬属动物杰克逊种和美洲小鼬的笔记。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , ['sɛvən] : - - - , [nəʊ'vembə(r)] - .
Jour . Mamm . , 7 : 313 - 330 , November 23 .
一天 . 乳房 . , 7 : - - - , 十一月 - .

日记。 Mamm.，7：313-330，11 月 23 日。

[web] , [əʊ] . [el] . , [ænd; ənd] [dʒeɪ] . [keɪ] . [dʒəunz] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . - .
Webb , O . L . , and J . K . Jones , Jr . 1952 .
韦伯 , 哦 . L . , 和 J . K . 琼斯 , 小 . - .

韦伯，OL，和 JK 琼斯，Jr.1952。

[æn; ən] ['ænəteɪtɪd] ['tʃeklɪst] [ɒv; əv] [nɪ'bræskən] [bæts] .
An annotated checklist of Nebraskan bats .
一个 带注释的 检查清单 的 内布拉斯加州 蝙蝠 .

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

['kænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , Mus .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [faɪv] : - - - , [meɪ] - .
Hist . , 5 : 269 - 279 , May 31 .
历史 . , 5 : - - - , 可能 - .

历史，5：269-279，5月31日。

[trænz'mɪtɪd] ['dʒænjuəri] - , - . - - -
Transmitted January 11 , 1954 . 25 - 2530
传输 一月 - , - . - - -

1954年1月11日播出。25-2530

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

开口如有神
听书破万卷